

DYRKNINGSVEJLEDNING

Vinterraps (Brassica napus oleifera L.)

VÆKSTFORM

Vinterraps udgør langt den største del af rapsproduktionen i Danmark. Rapsolie kan anvendes til fremstilling af spiseolie, margarine, motorbrændstof og opvarmning. Rapskrå, rapskager og eventuelt hele rapsfrø anvendes som proteinkilde til husdyr. Sorterne har et lavt indhold af både erucasyre og glucosinolater og udgør derfor et højt vurderet kvalitetsfoder.

JORDBUND

Vinterraps kan dyrkes på næsten alle jorder, dog undtaget humusrige, lavtliggende og vandlidende arealer. På de lettere sandjorder kan vanding være en fordel. På svære jorder skal man være ekstra påpasselig med tilberedning af såbedet. Reaktionstallet skal være højt, specielt ved hyppig rapsavl.

SÆDSKIFTE

Vinterraps har en stor forfrugtsværdi. Vinterhvede efter vinterraps giver 10-15 pct. større udbytte end vinterhvede efter vårbyg.

Af hensyn til risiko for angreb af kålbrot, bør man holde en afstand på 5 år mellem dyrkning af raps på samme areal. Er der fundet kålbrot i marken, bør man så en kålbrotresi-stent sort eller undgå at dyrke raps.

Er der andre hulstænglede afgrøder i sædskifte øges kravet yderligere til antallet af frie år. Andre hulstænglede afgrøder angribes f.eks. også af knoldbægersvamp. Eksempler på hulstænglede afgrøder er: hestebønne, ærter og kartofler. Her bør være 2 - 3 frie år mellem raps og den hulstænglede afgrøde

SORTER

Vælg sorter med et højt udbyttepotentiale af standardkvalitet over flere år. Vinterfastheden, sygdomsresistensen og standfastheden skal være i top. Der kan vælges sorter med skulpeopspingsresistens, hvis dryssespild før høst ønskes minimeret. Hvis man på forhånd ved at rapsen sås sidst i august, vælges der blandt de sorter, der har den bedste etableringsevne og vækst i efteråret.

SÅBED

August måned er ofte omskiftelig mellem tørt vejr og meget nedbør. Det er vigtigt at holde fugt i det øverste jordlag 1 til 2 cm for at opnå en god spirring. Gruppesåning med dyb jordbearbejdning under rapsrækken giver rapsen god mulighed for at udvikle sin pælerod med en efterfølgende god plante. Gruppesåningen giver også en bedre dræning, hvis der skulle komme vejr med kraftig nedbør. Uanset så metode er det vigtigt at frøet placeres i 2 cm dybde og der er fugt tilstede.

UDSÆD

Efter overvintring bør plantebestanden være 25-35 planter pr. m². De fleste sorter forhandles i units á 1,5

mill. frø. En unit sås på ca. 3,5-4 ha. Ved præcisionssåning på rækker sås 25-30 planter pr. m²

SÅNING

Af hensyn til rettidig såning af vinterraps er det vigtigt at have en tidlig moden afgrøde som forfrugt. Det kan være vinterbyg eller frøgræs.

Det bedste såtidspunkt er omkring 10.-20. august, første gang jorden er tjenlig, men senere såning helt frem til 1. september kan under gunstige vejrforhold nemt lade sig gøre. Selv om der vil være udbyttedgang ved såning af vinterraps først i september, kan det i den østlige del af Danmark godt lade sig gøre at så sent og få et acceptabelt udbytte. Ved sen såning kræves der ekstra omhu i alle etableringens faser samt ekstra kvælstoftildeling. Det er bedre at så sent, end såning i ubekvem våd jord eller, hvis der er udsigt til kraftig regn efter såning.

Der sås med 12 cm rækkeafstand i 2 cm's dybde. Alle så-maskintyper kan anvendes.

Direkte såning uden forudgående pløjning kan praktiseres, hvor der ikke for meget plantemateriale. Jorden skal være porøs, og harvning ned til 20 cm er oftest nødvendigt. Grubbesåning har også vist sig som en velegnet metode til direkte såning. Grubbesåning sker bedst med maskine på-monteret så-agrigat til placering af frøene, frem for de blæses ud oven på jorden.

Ved etablering uden forudgående pløjning, skal der være øget opmærksomhed på snegleangreb.

Før vinter skal planterne have 8-10 blade med et lavtsidende vækstpunkt, og rodhalsen skal være minimum 8 mm tyk.

GØDSKNING

Vinterraps skal normalt tilføres 30-40 kg N pr. ha enten samtidig med såningen (ved sen såning) eller midt i september (ved tidlig såning). Er der nedmuldet halm, er forfrugten frøgræs, eller er jordtypen sand (JB 1-3) skal der tilføres yderligere 10-20 kg N pr. ha samtidig med såningen. Gylle kan nedfældes før såning, eller tilføres ved 4 bladstadiet.

Om foråret tilføres ca. 160-200 kg N pr. ha fordelt på mindst 2 gange: 1. gang når væksten er begyndt først i marts, der tildeles 1/3 af kvælstofmængden i marker, der er kraftigt udviklet og i marker der er svagt udviklet tildeles 2/3 af kvælstofmængden. Rapsen færdig gødes midt april, St. 30, begyndende strækning, af hovedskud. Det er vigtigt at der tildeles svovl sammen med kvælstof. Svovlbehovet er 40 kg S/ha. 20% af kvælstoftilførselen. Behovet for kvælstof og tildelingsstrategi kan med fordel fastsættes ud fra biomassemålinger fra efteråret.

Som grundgødning anvendes der 25-35 kg P og 80-120 kg K pr. ha ved normal gødningstilstand (Pt. 2-4 og Kt. 7-10).

Landbrugsstyrelsens kvælstofnormer for 2023/24:
Se dyrkningskalender bagest i dyrknings-vejledningen.

Gylle er velegnet til vinterraps og af-hængig af gyllens indhold, kan PK gødningen og en del af kvælstoffet erstattes med 25-35 tons gylle pr. ha fra sidst i marts til midt i april. Svovl indholdet i gylle er utilgængeligt, og kan ikke medregnes.

Bormangel kan der forekomme oftest ved gejl vækst og ved begyndende tørke i foråret. Tilfør 1-2 l/ha flydende bor inden afgrøden kommer i blomst. Høje reaktionstal medføre bormangel.

Magnesiumtilførsel er nødvendig ved magnesiummangel under 5, og specielt på jorder med høje kaliumtal. Magnesiumforsyningen kan sikres ved tilførsel af 100-200 kg Kieserit pr. ha eller ved tilførsel af magnesiumholdige gødninger

Vanding

Vinterrapsen betaler særdeles godt for vanding på sandjorderne, helt frem til skulpernes gulvarvning.

UKRUDT

Veletableret vinterraps har en særdeles god konkurrenceevne over for ukrudt. Der er dog nogle undtagelser. Det gælder især for: fuglegræs, hyrdetaske, kamille, burresnerre, valmue og spildplanter af korn.

Før fremspiring

Mod hyrdetaske og enårig rapgræs kan et clomazon-holdigt produkt anvendes f.eks. Kalif 360 CS. Clomazon anvendes lige efter såning, og ikke senere end før fremspiring. Der anvendes 0,15-0,25 pr. ha, laveste dosering mod hyrdetaske og fuglegræs, højeste dosering mod burresnerre. Foruden hyrdetaske har midlet effekt mod burresnerre, fuglegræs, tvetand, storkronet ærenpris og enårig rapgræs, mens effekten på kamille og kornvalmue er for ringe.

Stomp CS er godkendt til mindre anvendelse til udbringning lige efter såning med 0,44 l pr. ha. Stomp CS er effektiv på kornvalmue.

Efter fremspiring

Spildplanter af korn eller græs kan bekæmpes med 0,5 - 1,0 l Focus Ultra pr. ha + Dash eller 0,3 - 0,7 l Agil 100 EC / Zetrola pr. ha. Mindste dosering mod små planter af vårbyg med 2 - 4 blade. Focus Ultra foretrækkes, hvor der skal bekæmpes rajgræs og Agil / Zetrola ved bekæmpelse af spildkorn. Ovennævnte midler anvendes, hvis der er fare for, at især spildkorn vil hæmme væksten af rapsen i løbet af efteråret.

Belkar giver mulighed for at bekæmpe tokimbladet ukrudt i løbet af efteråret. Belkar anvendes med 1 eller 2 behandlinger i efteråret. 2 behandlinger med 3 ugers mellemrum med 0,25 l pr. ha pr. gang, er at foretrække i marker med meget ukrudt, samt ved lidt større bestand af Storkenæb. Belkar har god effekt på Kamille, Storkenæb, Hejrenæb, Burresnerre, Kornblomst, Valmue, Tvetand og Hyrdetaske. Der er nogen effekt på Fuglegræs og Agerstedmoder.

Der må anvendes 0,25 l Belkar pr. ha i stadie 12-15, og evt. opfølgning med 0,25 l Belkar pr. ha 3 uger senere. I stadie 16 - 30 må Belkar anvendes med 0,5 l pr. ha.

Kerb 400 SC må bruges i november og december måned til bekæmpelse af enårigt rapgræs, spildkorn og andet græsukrudt i vinterraps. Kerb 400 SC er resistensbryder og anbefales specielt i sædskifter med meget græs. Kerb 400 SC skal anvendes i fugtigt vejr, når jordtemperaturen er under 10 grader.

Spildkorn og andre græsser kan ved udlæg af rødsvingel eller stivbladet svingel bekæmpes med Focus Ultra eller Agil. Ved udlæg af andre frøgræsser er der ingen mulighed for græsukruds-bekæmpelse.

Ukrudt forår

Kamille, kornblomst, burresnerre, snerlepilurt mm. kan bekæmpes i det tidlige forår med 0,2 - 0,3 l Galera pr. ha + 0,2 - 0,3 l PG 26N pr. ha. Blomsterknopperne må ikke være synlige ved anvendelse af Galera, da der sker skade på rapsen. Ingen anvendelse efter st. 50. Galera må anvendes til 2. april 2024, hvorefter der er forbud.

Kamille og andre kurvblomstrede arter kan bekæmpes med 0,11 kg Matrigon 72 pr. ha + 0,5 l Olie pr. ha under gode vækstforhold og temperaturer over 10°C. Må ikke anvendes efter st. 55. 0,65 l Korvetto pr. ha er også en mulighed til bekæmpelse af kamille, burresnerre og andet ukrudt. Korvetto må anvendes fra st. 30 til 50. Der må ikke være blomster i afgrøden ved anvendelse af Matrigon 72 og Korvetto. Godkendelsen på Matrigon 72 og Korvetto udløber 31/3-2024.

VÆKSTREGULERING

Tidlig sået raps kan vækstreguleres, hvis der er risiko for at vækstpunktet strækker sig for meget inden vinteren og rapsen derved bliver mere udsat for udvintringsskader. Juventus 90 kan anvendes på 5 - 9 bladsstadiet med 0,5 - 1,0 l Caryx pr. ha eller 0,7 l Caryx pr. ha i stadie 13 - 20. De tidligste behandlinger giver størst effekt.

Der er også mulighed for vækstregulering i foråret. Det er selvfølgelig risikoen for lejesæd, der kan udløse en behandling. Det hævdes at en sådan behandling gør, at planten får bedre mulighed for at udvikle frø på sideskuddene, da hovedskuddet hæmmes og sideskuddene får mere lys og luft. I forsøg har der ikke været merudbytte for denne behandling. Stråstive sorter må foretrækkes

SYGDOMME

Kålbrot er ødelæggende for rapsens rod. Kålbrot kan undgås ved et sædskifte på min. 5 rapsfrie år, passende højt reaktionstal og god dræning. Der findes kålbrotresistente sorter der kan anvendes.

Rodhalsråd (Phoma) er en sædskiftesygdom, men spredes også med vinden. De fleste sorter har god resistens. Bekæmpelse kan ske når rapsen har 3 - 4 blade om efteråret med f.eks. 0,25 l Cantus pr. ha, evt også om foråret.

Lys bladplet ses i nogle år, antagelig på baggrund af nogle milde og fugtige efterår/vintre. Lysbladplet er meget udbredt i England, hvor det er den vigtigste svampesygdom. Bekæmpelse i Danmark foretages normalt først om foråret i de år, hvor svampen er betydende. 1995 og 2016 var der betydende angreb. Der er resistensforskelle mellem raps-sorterne. Flere midler er effektive.

Knoldbægersvamp kan under fugtige forhold og ved hyppig rapsdyrkning give alvorlige angreb i afgrøden. Fugtigt vejr ved blomstring, kan medføre fremspiring af knoldbægersvampens frugtleger og spredning af svampens sporer på grund af et særligt gunstigt mikroklima for knoldbægersvampen. Bekæmpelse er normalt nødvendig enten 1 eller 2 gange. Det er meget vigtigt ikke at komme på bagkant her, behandlingen sættes ind lige netop, før de første kronblade begynder at falde. Fuldblomst st. 65. Der er mange gode midler til rådighed. En behandling kan f.eks.

bestå af: 0,75 l Propulse SE 250 pr. ha, hvis det vurderes, at der er et stort behov, kan der følges op 14 dage efter, med f.eks. 0,5 l Pictor Active pr. ha.

Skulpesvamp udvikles epidemisk i et fugtigt og varmt klima. Behandlingen mod knoldbægersvamp har normalt nogen effekt på skulpesvamp og specielt, hvis der vælges en 2 delte behandling. Amistar, Pictor Active og Propulse SE 250 EW har bedst effekt.

Gråskimmel ses normalt kun som sekundære angreb efter frostbeskadigelser eller andre fysiske beskadigelser af afgrøden. Flere midler har effekt.

SKADEDYR

Trips og jordlopper kan angribe de spæde planter ved fremspiringen. Rapsjordlopperne bekæmpes frem til 4 blads stadiet ved 10% bortnavet bladareal med eksempelvis 0,2 kg Lamdex pr. ha.

Det er normalt larven, der senere udvikler sig i stængelen, der forvolder de største skader. Benyt gule fangbakker til at vurdere behovet og tjek varslingsstjenesten. Bekæmpelse af rapsjordloppers larve er normalt bedst midt i oktober, men behandlinger helt hen i november, har også været effektive. I angrebne marker, hvor der ikke er bekæmpet jordlopper, kan angrebet være ødelæggende for afgrøden. Der kan også anvendes Lamdex mod larverne.

Glimmerbøsser kan gøre skade i det tidlige knopstadium. Hvis der er 4 - 8 biller pr. plante, bør der foretages bekæmpelse. Glimmerbøsser er ofte resistente mod pyrethroider, hvorfor der må vælges midler med anden virkemekanisme. 0,2 l Mavrik/Evure Neo pr. ha er en mulighed.

Bladribbesnudebiller er det tidligste skadedyr om foråret i vinterrapsen. Har man erfaring med angreb i egne marker anbefales at udsætte fangbakker for at følge flyvningen. Bekæmpelse udføres ved fangster over 10 - 15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Bekæmpelsen udføres ca. 10 dage efter de første biller er fanget, da de ikke lægger æg straks efter indflyvning. Har man ikke erfaring for angreb i egne marker, kan flyvningen følges i registreringsnettet. Bekæmpelse 0,15 l Kaiso Sorbie pr. ha.

Skulpesnudebiller angriber vinterrapsen i fuld blomst, når der er dannet skulper. Den vejledende skadetærskel er 1-2 biller pr. plante. Afgrøden bør behandles med et pyrethroid når skadestærsklen er overskredet. Det er vigtigt at følge op på effekten, da der løbende kommer ubeskyttede områder på planten efterhånden som der kommer nye skulper til. Overskrides skadestærsklen skal der genbehandles. Det er meget vigtigt at bekæmpe skulpesnudebiller, da et kraftigt angreb kan bane vej for skulpegalmyggen.

Skulpegalmyggen lægger sine æg i skulper der er under 2 cm lange, eller i de huller som skulpesnudebiller har lavet i skulperne. Galmyggen lægger ca. 60 æg, og larverne kan ødelægge de angrebne skulper helt. Der udsendes varsel, når skulpegalmyggen begynder sin flyvning, og bekæmpelse foretages med et pyrethroid.

Det vil ofte være tilstrækkeligt med randbekæmpelser, hvis skulpesnudebillerne er blevet godt bekæmpet.

Husk at al insektbekæmpelse med pyrethroider i blom-

strende vinterraps skal foregå uden for biernes trækperiode. Mavrik kan anvendes i dagtimerne, da de ikke er bifarlige.

Snegle kan være ødelæggende i raps, især på knoldede jord. Bekæmpelse kan ske med et jernsulfatgranulat-holdigt middel. Der tildeles sneglekorn, så der er 30 - 40 korn pr. m². Hvis sneglene æder alle kornene, skal der genbehandles. Sneglekorn udbringes med ATV eller anden spredning lige efter såning eller ved konstateret begyndende snegleangreb. En periode med sort jord før såning og et godt såbed uden knolde begrænser risikoen for et snegleproblem

HØST

Der er i princippet to muligheder at vælge imellem, når vinterrapsen skal høstes. Skårlægning med efterfølgende tærskning vælges for at få en ensartet moden afgrøde og for at undgå dryssespild før høst. Skårlæg specielt i de egne, hvor blæsevejret er hyppigt i høstperioden. Skårlægning foretages, når 80 pct. af frøene i skulperne på hovedskuddets midterste tredjedel er rødlig/brune eller sorte. Vandindholdet vil da være på ca. 20 - 25 procent. Der skårlægges på så høj en stub som muligt, og skårlægningen skal være ensartet og fri for sammenslæbte bunker.

Der tærskes 10 - 14 dage efter skårlægningen.

Tærskning direkte på roden vælges i en kraftig, hældende og ensartet afgrøde. Husk sidekniv. Denne høstmetode giver få maskinudgifter, stor tærskkapacitet og hurtig aftørring efter regn. Endelig kan der høstes direkte med forudgående nedvisning. Direkte høst kan foretages, når alle frøene er sorte, og vandindholdet er under 15 pct. Tærskningen kan godt fortsætte ud på aftenen og natten, uden at der sker særlig stivning i vandindholdet.

TØRRING OG EFTERBEHANDLING

Umiddelbart efter høst tørres rapsen ned til max. 9 pct., og gerne under 8 pct. vand. Der kan under særligt fugtige vejrforhold ved høst ske spiring af rapsfrøene, hvilket skærper kravene til effektiv tørring for at mindske en negativ kvalitetspåvirkning.

Efter tørring skal frøet kunne køles/beluftes. Det er vigtigt at tørrekanalerne ligger tæt, og at der er tilstrækkelig blæserkapacitet, da raps lejres meget tæt. Vandprocent og temperatur kontrolleres løbende, da rapsfrø hurtigt taber olie kvalitet (harskes) hvis det ikke er lagerfast. Herudover fremmes udvikling af lagersvampe og skadedyr i raps som ikke er færdigtørret. Hvis der er tendens til temperaturstigning, skal der beluftes med kold luft, eller evt. tørres yderligere.

Rensning af det høstede frø kan være nødvendig, idet ukrudtsfrø, umodne frø og/eller grønne plantedele øger luftmodstanden, og dermed risikoen for varmedannelse.

UDBYTTE

Udbyttet i vinterraps på god jord er på 4000 til 5000 kg/ha. Vinterraps vejer ved normal renhed ca. 650 kg pr. m

DYRKNINGSKALENDER

Aug.	Udsæd 35 - 40 planter pr. m ² i efteråret. Sådybde 2 cm	Gødningsnorm 2023/24 Ved udbyttentorm på 4600 kg pr. ha på lerjord: 204 kg N pr. ha forfrugt korn, 186 kg N pr. ha forfrugt frøgræs.
Aug.	Gødskning 30-50 kg N pr. ha ved såning eller senest 1 måned efter såningen. Ved nedmuldning af halm eller efter græsfrø skal der yderligere tilføres 10-20 kg N pr. ha. Ukrudt Lige efter såning (ikke senere end før fremspiring): 0,15 - 0,25 l clomazon holdigt produkt pr. ha Ell. 0,25 l Belkar pr. ha st.12-15 + 0,25 l Belkar pr. ha st.16-30	Ved udbyttentorm på 3900 kg pr. ha på vandet sandjord: 193 kg N pr. ha forfrugt korn, 175 kg N pr. ha forfrugt frøgræs.
Sept./Okt.	Ukrudt og skadedyr Spildkornsplanter og græsukrudt bekæmpes med Agil 100 EC / Zetrola eller Focus Ultra. Insektangreb (f.eks. rapsjordloppens larve midt i oktober) bekæmpes med f.eks. 0,2 kg/ha Lamdex. Svampe Vær opmærksom på rodhalsråd, evt. vækstregulering	Marts Gødskning Primo marts tilføres første tildeling af kvælstof. Der tildeles 1/3 af kvælstofmængden i marker der er kraftigt udviklet og i marker der er svagt udviklet tildeles 2/3 af kvælstofmængden. Der grundgødes med 25-35 kg P og 100-120 kg K og 30-40 kg S pr. ha. April Gødskning Midt april St. 30, begyndende strækning, af hovedskud, tildeles det sidste kvælstof. Ukrudt Kamille kan bekæmpes med f.eks. 0,11 kg Matrigon 72 pr. ha + olie. . Maj Skadedyr Glimmerbøsser, skulpesnudebiller og skulpegalmug bekæmpes. Mavrik er ikke bifarlige. Sygdomme Knoldbægersvamp, skulpesvamp m.fl. bekæmpes efter behov. En eller to behandlinger. Juli Høst Skårlægning - mejetærskning efter 10-14 dage. Direkte høst på roden (ensartet afgrøde). Nedtørring og beluftning straks efter høst.

Maj 2024