

Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 4, 2021

- Hussar OD eller Hussar Plus OD, god mod enårig rapgræs
- Ariane FG S, stærk mod tidsler

Der har igen i år været rigtig god effekt af de tidligere Hussar behandlinger mod enårig rapgræs, selvom det har været koldt. Det vil dog i de fleste tilfælde være nødvendigt med en opfølgende behandling, se [FrøavlsINFO nr. 2](#).

Tag gerne din frøavlskonsulent med på råd, når sprøjteplanen skal fastlægges.

I de korte engrapgræssorter kan en weed-wiper hjælpe mod alm. rapgræs, hejre, kvik og andet ukrudt, der er højere end engrapgræsset. Resten må klares med håndlugning, pletsprøjtning eller fraskæring til høst. Kontakt din frøavlskonsulent, hvis du ønsker at låne en 12 m weed-wiper.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Har der tidligere været anvendt Hussar, vil der sjældent være behov for yderligere bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, bortset fra skræpper og tidsler på et senere tidspunkt. I de situationer hvor der er tilbageværende 2 kimbladet ukrudt er følgende midler mulige valg:

Zypar

Zypar har specielt god effekt på hundepersille, storkenæb, lægejordrøg og lancetbladet vejrbred, men bekæmper også kamille og de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zypar er aktuel fra primo april.

0,75 - 1,0 l Zypar pr. ha.

Primus

Denne løsning kan anvendes nu specielt hvor kamille er hovedproblemet. Ved sprøjtning sidst i april først i maj opnås også effekt på skræpper med den høje dosering.

0,075 l - 0,1 Primus/Saracen pr. ha.

Catch

Catch giver en god og billig ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burrenerre og kornblomst. Kamille og storkenæb bekæmpes kun inden planterne bliver for store, så løsningen er aktuel fra primo april.

0,6 l Catch pr. ha.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Starane XL

Er hovedproblemet burrenerre og skræpper er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er mindst 10-15°C, hvilket gør, at behandling trækkes til slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ dyr.

1,5 l Starane XL pr. ha.

Ariane FG S

Ariane FG S er primært interessant mod tidsler. Ariane kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års marker udlagt i korn og i ældre marker med op til 3,0 l pr. ha. En dosering på 1,5 l pr. ha vil dog ofte være tilstrækkeligt overfor tidsler. I engrapgræs er det ofte nødvendigt med en opfølgende behandling mod tidsler i slutningen af maj efter tidligere Hussar sprøjtninger, der kun sætter tidslerne tilbage. Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen er en god allround løsning på det sene tidspunkt. Løsningen er effektiv men dyrere end de øvrige.

Mod tidsler 1,5 - 1,75 l pr. ha.

Sen ukrudtsbekæmpelse med bred effekt:
1,5 - 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha.

DFF

DFF produkterne må kun anvendes én gang pr vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, kan det være nødvendigt at forstærke ovennævnte løsninger med 0,05 - 0,1 l DFF pr. ha, hvis agerstedmoder, rødtvetand og ærenpris også er ukrudtsproblemet. Den høje dosering anvendt i forbindelse med fugtig jord, kan også forhindre nyfremspiring af enårig rapgræs.

Bekæmpelse af rodukrudt

Skræpper, agertidsler og haremad starter væksten sent i foråret. Tidsler og skræpper er især et problem i engrapgræs efter hvidkløver. På nogle eksportmarkeder er der nul-tolerance over for skræpper i engrapgræs. Så skræpper skal altid bekæmpes 100 pct.

[Catch](#), [Zypar](#), [DFF](#), [Hussar OD](#) og [Hussar Plus OD](#) er godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs.