FrøavlsINFO
8. juni 2020

Bladsvampe i alm. rajgræs - opfølgning

FrøavlsINFO nr. 8, 2021

- **Afsluttende svampebehandling ved blomstring**
- **Sortrust elsker varme og tørre forhold**
- **Entargo godkendt i frø**

Efter en tør april har vi i maj fået ekstraordinært meget nedbør. Generelt har rajgræsmarkerne udviklet sig voldsomt, og står i dag meget kraftige. Vækstreguleringen er forhåbentligt overstået, og mange marker er samtidig svampebehandlet. Det er specielt kronrust der skal holdes øje med, og bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 procent dækning. Meldug forekommer også i nogle marker, men anbefales kun bekæmpet indtil skridning.

Den vigtigste svampebehandling udføres ved blomstring, som vil begynde i de tidlige sorter i løbet af en uges tid. Øvrige sorter vil starte blomstringen indenfor de næste 14 dage afhængig af beliggenhed. Kronrust kan specielt udvikle sig kraftigt i den sidste del af vækstperioden, hvor angrebene i nogle tilfælde ses helt op på de øverste blade. Dette er nok en medvirkende årsag til, at det er de sene behandlinger op mod blomstring, der er de mest lønsomme.

Sortrust-risiko under varme forhold

I de senere år har vi set angreb af sortrust på nogle lokaliteter. Sortrust er en meget aggressiv og udbyttekrævende svamp som kan forventes, specielt under varme og tørre forhold. Det er derfor en svampesygdom, vi skal være godt forberedt på.

Vær specielt opmærksom i rajgræs udlagt i renbestand, som er mere modtagelig for sortrust end rajgræs udlagt i vårbyg.

Bladpletsvamp

Net- og pletnekrose bekæmpes i fugtige år ved over 10 pct. angrebne planter indtil afsluttet blomstring.

Aktuelle midler

Til bekæmpelse af kronrust, bladplet og sortrust kan der anvendes ca. 0,5 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,5 l Viverda pr. ha.
Bell og Viverda er udgået, og restlagre må anvendes i denne sæson. Har man ikke midlerne på lager, er der andre midler der kan anvendes. 0,5 Folicur Xpert + 0,15 Comet Pro er en god løsning.

Entargo som indeholder Boscalid, som er det ene af de to aktivstoffer fra Bell og Viverda har fået en minor-use godkendelse i frø.
Boscalid indholdet i 0,5 l Bell er 250 g, hvilket er samme indhold som findes i 0,25 l Entargo. Bell indeholder også Epoxyconasol, som kan erstattes af f.eks. Orius Max, der indeholder Tebuconasol.

Derfor kan en løsning til erstatning for Bell og Viverda være følgende:

0,25 l Entargo + 0,3 l Orius Max + 0,15 l Comet Pro pr ha.

Skadedyr

Ved angreb af skadedyr som mider og lus kan en bekæmpelse være aktuel sammen med en kommende svampesprøjtning. Lamdex er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs, og kan anvendes med 0,3 l pr ha.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF