

Efterårsbehandling i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 9, 2021

- **Afpudsning af stub**
- **Enårig- og alm. rapgræs, skadedyr, snegle, rust og starthjælp til svage udlæg**

Flerårsmarker skal afpudses til en stubhøjde på 3-5 cm, og de gamle stubrester skal slås helt af. En skiveslåmaskine med skarpe knive er billigst og hurtigst til afpudser-opgaven. I 1. års marker skal dæksædsstubben afpudses til en stubhøjde på 5-6 cm, så snart kornet er høstet. Engrapgræsudlæg i vintersæd er kraftigt udviklet over jorden, men har normalt et lille rodsystem med få udløbere under jorden. Her er det vigtigt at få lange blade pudset helt i bund, så planten stimuleres til at udvikle rødder og udløbere, der danner grundlaget for frøstænglerne til næste år.

Afgrøderne pudses igen efter behov sidste gang omkring 1. oktober i en højde på 6-8 cm. I frodige år, kan en ekstra afpudsning midt i oktober være aktuel hvis bladene hænger.

Nyfremspiret enårig og alm. rapgræs

Bekæmpelse af småt og nyfremspiret enårig- og alm. rapgræs kan ske med Boxer (max 1,5 l pr. ha) og/eller Stomp CS (max 1 l pr. ha), pas på afdrift og fordampning. Alternativt anbefales 0,1 l DFF pr. ha, så snart nyfremspiret græsukrudt kan anes. Disse produkter skal udsprøjtes på fugtig jord eller der skal komme regn umiddelbart efter behandlingen. For at opnå god effekt af jordmidler, må der ikke være for meget plantemateriale på jorden, når der behandles. 0,02 l Hussar OD + 0,5 l olie eller 0,05 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie pr. ha, har effekt på etableret enårig rapgræs og små planter alm. rapgræs. Hussar må anvendes indtil 15. september.

Atlantis med i alt op til 0,6 l pr ha, har i forsøg vist god effekt på alm. rapgræs i efteråret. Atlantis er registreret til "mindre anvendelse". Atlantis hæmmer svage udlæg, så doseringen skal afstemmes afgrødens beskaffenhed. Ved anvendelse af Atlantis, må der ikke senere i vækstsæsonen f.eks. anvendes Hussar.

Som supplement til græsukrudsbehandling er Mateno Duo under afprøvning. Produktet har god effekt på nyfremspiret væselhale; men påvirker også engrapgræsplanterne. Produktet er ikke godkendt og må ikke anvendes.

Agil

Agil anvendes mod spildkorn og græsukrudt med op til 0,12 l pr. ha i engrapgræs efter høst af dæksæd. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. ha. Lav en tidlig

behandling så snart græsukrudt/korn er fremspiret. Pas på skade ved høje temperaturer. Ved 18°C bør der max. bruges 0,08 l Agil pr ha. Ved 12°C kan der anvendes op til 0,12 l Agil pr. ha. Brug ikke Agil ved udsigt til over 20°C. Hvis ikke vi får specialtilladelse til at anvende Reglone, er Agil eneste mulighed for at bekæmpe eller reducere niveauet af spildkornplanter og hejre.

Skadedyr

Fritfluer i nyudlæg og galmyg i gamle marker har flyvning fra nu og i de kommende uger. Sæt fangbakker ud og følg med i flyvningerne. Ved væsentlig forekomst behandles med et pyrethroid i forhold til konstateret flyvning. Tjek også for bladlus, som vi mener overfører virus, der senere ses som pletter, hvor planterne mistrives. Under fugtige forhold skal der også holdes øje med eventuelle snegleangreb.

Rustsvampe

Engrapgræs med N-mangel bliver let angrebet af rustsvampe. Vi ser ofte større effekt ved at tilføre kvælstof end ved at svampesprøjte, men svage 1. års udlæg kan hjælpes på vej med en svampesprøjtning i efteråret. [Folicur Xpert](#) og [Folicur EW 250](#) med 0,3 - 0,5 l pr. ha er godkendt til mindre anvendelse mod rust om efteråret.

Gødskning

Undgå at svage udlæg mangler kvælstof. Tilfør 25 - 40 kg N pr. ha snarest, så planterne får en god start. Engrapgræs skal have en pæn størrelse inden planterne danner underjordiske udløbere, så det gælder om at stimulere væksten de kommende måneder. Udløberne skal være dannet inden vinter, ellers bliver der for få frøstængler næste år. I kraftige udlægsmarker ventes med kvælstof til midt i september.

Vi anbefaler at tilføre 45-60 kg N pr. ha. i 1. års marker efter hvidkløver og 60-80 kg N i marker udlagt i ærter, korn og til flerårsmarker. Engrapgræs udlagt i vintersæd, splitgødskes med to gange 40 N pr. ha.

Gødningsnorm til engrapgræs høst 2022:

Mark-/Fodertyper (Balin, Chester, Oxford, Lato): 160 kg N pr. ha

Plænetyper (andre sorter): 170 kg N pr. Ha

[Sortsliste](#)

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF