

# Spildkorn, ukrudt, skadedyr og gødskning i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 11, 2021

- Ukrudts- og spildkornsbekæmpelse i frømarken
- Skadedyr
- Gødskning af rødsvingel

Det er ofte nødvendigt at bekæmpe spildkorn i 1. års afgrøder efter korn, for at undgå at spildkornplanterne hæmmer udlægget.

Spildkorn bekæmpes bedst, mens det er småt, men ved for tidlig behandling risikerer man yderligere fremspiring. Vårbyg er lettest og rug er sværest at bekæmpe. Der er lavere tolerance for spildkornplanter af vintersæd end af vårsæd. Spildkorn og ukrudtsgræs, bortset fra enårig rapgræs og væselhale, bekæmpes med op til 1,2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash eller 0,6 l Agil pr. ha + sprede-klæbemiddel. Agerrævehale og rajgræs bekæmpes allerede i efteråret med 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha. **Marker med agerrævehale der er resistent over for Focus Ultra skal ompløjes.**

**Focus Ultra må kun bruges én gang pr. vækstsæson. Derfor vil Agil efterår og Focus Ultra forår ofte være en god kombination.**

### Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i frømarken

Express 50 SX, Nuance Max 75 WG og DFF er godkendt til efterårsbrug i frøgræs. Der anvendes 7,5 g pr ha af Express eller 5 g pr ha af Nuance tilsat spredeklæbemiddel mod specielt kamille, kornvalmue og fuglegræs. Midlerne må ikke anvendes efter 30. september.

Enårig rapgræs kan hæmmes med 0,02 l Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD. Til Hussar produkterne tilsættes 0,5 l olie pr. ha. Produkterne må bruges frem til 15. september. En opfølgende behandling med Hussar om foråret mod enårig rapgræs kan være aktuell i 1. års marker.

Der må ikke anvendes Hussar til foråret, hvis der er brugt Express/Nuance i efteråret.

Mod agerstedmoder, tvetand og ærenpris er 0,025 - 0,070 l/ha DFF en god løsning. Højeste dosering ved stort ukrudt.

Venlig hilsen  
DLF  
Avlsafdelingen

### Skadedyr - hold øje med rødsvingelmarken

De fleste rødsvingel marker gror for øjeblikket fornuftigt til. Skulle dette ikke være tilfældet, kan årsagen være skadedyrsangreb.

I ældre marker af rødsvingel kan insektlarver i stort antal beskadige planterne. Larver af græsmøl og løvsnudebiller gnaver på rødderne og forårsager, at græsset i pletter mistrives og går ud. Ved kraftig angreb af græsmøl bør arealet ompløjes og efterfølges af en bredbladet afgrøde til foråret. Er løvsnudebillen problemet kan man så vintersæd efter den 1. oktober med et godt resultat.

I de senere år har vi visse steder set kraftige angreb af aksløberens larve i specielt 1. års afgrøder. Mod denne skadevolder kan der anvendes [Avaunt 150 EC](#) med 0,45 l/ha. Brug 250 - 300 l vand/ha. Midlet er godkendt til mindre anvendelse og må anvendes om efteråret fra 5. september til 1. december.

### Gødning

Normalt gødes rødsvingel efter sidste afpudsning omkring 10. oktober. Der gødes med 70 - 75 kg N pr. ha. Ved udlæg i ærter eller hvidkløver nedsættes mængden til ca. 50 kg N pr. ha.

Svage og tynde udlæg gødes med 25 kg N pr ha så snart dæksædshalmen er fjernet. Resten af gødningen udbringes i slutningen af september.

Ved normale fosfor- og kalital anvendes ren kvælstofgødning. Ved meget lave tal kan med fordel anvendes NPK-gødning. Svovl behøver man ikke at tilføre om efteråret. Kvælstofnormen til rødsvingel høst 2020/21 er 150 kg N pr. ha (på nær JB 11, 100 kg N pr. ha).

Gylle kan anvendes når fordelingen er præcis og det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan regnes med 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammoniumkvælstof, under forudsætning af "godt udbringningsvejr".

Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. oktober i græsfrømarker.