

Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2021

- Tokimbladet ukrudt i frømarken
- Spildkorn og agerrævehale
- Bladsvampe

Rødsvingel er en dårlig konkurrent så længe afgrøden ikke er groet sammen, og ukrudtsplanter der har overlevet efterårets behandlinger er allerede store, så krav til effekt overfor 2-kimbladet ukrudt er høj.

Zypar

Zypar har specielt god effekt på hundepersille, storkenæb, lægejordrøg og lancetbladet vejrbred, men bekæmper også kamille og de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zypar er aktuel fra primo april.

0,75 - 1,0 l Zypar pr. ha.

Primus

Denne løsning kan anvendes nu, specielt hvor kamille er hovedproblemet. Ved sprøjtning sidst april først i maj opnås også effekt på skræpper med den høje dosering.

0,075 l - 0,1 Primus/Saracen pr. ha.

Catch

Catch giver en god og billig ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burresnerre og kornblomst. Kamille og storkenæb bekæmpes kun inden planterne bliver for store, så løsningen er aktuel fra primo april.

0,6 l Catch pr. ha.

Starane XL

Er hovedproblemet burresnerre og skræpper er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er mindst 10-15°C, hvilket gør, at behandling trækkes til slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ dyr.

1,5 l Starane XL pr. ha.

Ariane FG S

Ariane FG S er primært interessant mod tidsler. Ariane kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års marker udlagt i korn og i ældre marker med op til 3 l pr. ha.

En dosering på 1,5 l pr ha vil dog ofte være tilstrækkeligt overfor tidsler. Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen er en god allround løsning på det sene tidspunkt. Løsningen er effektiv men dyrere end de øvrige.

Mod tidsler 1,5 - 1,75 l pr ha.

Sen ukrudtsbekæmpelse med bred effekt:
1,5 - 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha.

DFF

DFF produkterne må kun anvendes én gang pr vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, vil det være nødvendigt at forstærke ovennævnte løsninger med 0,05 l DFF pr ha, hvis agerstedmoder, rødtvetand og ærenpris også er ukrudtsproblemet.

Agil

Konkurrerende spildkorn og agerrævehale, bekæmpes bedst i starten af april. Begge dele vil ofte nå at blive for kraftige, hvis de først bekæmpes sammen med grove græsser i maj. Spildkorn kan bekæmpes/hæmmes med 0,4 l Agil pr. ha, men er der agerrævehale af betydning anvendes 0,8 l Agil pr ha. Bemærk at der kun må behandles i alt 2 gange med max. 0,8 l pr. ha Agil pr. vækstsæson. Behandlingen mod agerrævehale følges senere op i første halvdel af maj med Focus Ultra, herom senere.

0,4 - 0,8 l Agil pr ha + 0,1 l spr.kl.mid. pr. 100 l vand

Følgende midler er godkendt til mindre anvendelse i rødsvingel, og vejledningen for de enkelte midler kan hentes ved at klik på midlet: [DFF](#), [Zypar](#), [Catch](#), eller på [Middeldatabasen](#).

Bladsvampe

I nogle rødsvingel marker ser vi ind imellem en del meldug. Disse angreb er forbigående og forsvinder normalt af sig selv i løbet af et par uger. Bladpletsvampe kan undertiden forekomme med kraftigere angreb. Forsøg har dog givet meget varierende merudbytte for svampekæmpelse i foråret. Er angrebene meget kraftige kan der anvendes Viverda med op til 0,4 l pr. ha. Viverda sælges ikke mere, men må anvendes i foråret. Alternativt 0,15 - 0,3 Folicur Expert + 0,15 Comet.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF