

Ukrudtsbekæmpelse i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2021

- Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
- Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på problemukrudt

Tiden er inde til at artsbestemme de tokimbladede ukrudtsarter i strandsvingel marken. I marker med højt ukrudtstryk og store tokimbladede ukrudtsplanter, er det nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen nu. Midlerne har forskellig effekt på de forskellige ukrudtsarter. Efterfølgende er angivet i hvilke situationer, de hver i sær er at foretrække.

Zypar

Zypar har specielt god effekt på hundepersille, storkenæb, lægejordrøg og lancetbladet vejbred, men bekæmper også kamille og de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zypar er aktuel fra primo april.

0,75 - 1,0 l Zypar pr. ha.

Primus

Denne løsning kan anvendes nu, specielt hvor kamille er hovedproblemet. Ved sprøjtning sidst i april først i maj opnås også effekt på skræpper med den høje dosering.

0,075 l - 0,1 Primus/Saracen pr. ha.

Catch

Catch giver en god og billig ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burresnerre og kornblomst. Kamille og storkenæb bekæmpes kun, inden planterne bliver for store, så løsningen er aktuel fra primo april.

0,6 l Catch pr. ha.

Starane XL

Er hovedproblemet burresnerre og skræpper er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er mindst 10-15°C, hvilket gør, at behandling trækkes til slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ dyr.

1,5 l Starane XL pr. ha.

Ariane FG S

Ariane FG S er primært interessant mod tidsler. Ariane kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års marker udlagt i korn og i ældre marker med op til 3,0 l pr. ha. En dosering på 1,5 l pr ha vil dog ofte være tilstrækkeligt overfor tidsler. Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen er en god allround løsning på det sene tidspunkt. Løsningen er effektiv men dyrere end de øvrige.

Mod tidsler 1,5 - 1,75 l pr ha

Sen ukrudtsbekæmpelse med bred effekt:

1,5 - 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha.

DFF

DFF produkterne må kun anvendes én gang pr vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, vil det være nødvendigt at forstærke ovennævnte løsninger med DFF, hvis agerstedmoder, rødtvetand og ærenpris også er ukrudtsproblemet.

0,05 l DFF pr. ha.

Følgende midler herunder er omfattet af reglen om "mindre anvendelses godkendelse".

Vejledningen for de enkelte midler kan hentes ved at klikke på midlet: [DFF](#), [Zypar](#), [Catch](#), [Primera Super](#), [Foxtrot](#) eller på [Middeldatabasen](#).

Primera Super mod græsukrudt

Med Primera Super/Foxtrot har vi mulighed for at bekæmpe vindaks, agerrævehale, flyvehavre og alm. rapgræs i strandsvingel.

Vær specielt opmærksom i ældre frømarker, hvor problemet med alm. rapgræs ofte er størst.

Der skal behandles fra midt i april ved gode vækstbetingelser og 15-20°C. Undgå at behandle strandsvingel, hvis den er tørkestresset, da det kan påvirke afgrøden for meget.

0,8 l Primera S pr. ha. eller

0,5 l Foxtrot pr. ha.

der tilsættes 0,1 l sprede klæbemiddel pr.100 l vand

Weed-wiper

Det er muligt at låne en 12 m weed-wiper til frømarker mod græsukrudt, korn, eller afvigende planter, som kan give problemer. Men for at weedwiperen kan anvendes kræves en højdeforskel på mindst 15 cm mellem afgrøde og ukrudt.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF