

Hussar i bakkesvingel mod enårig rapgræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2022

- Hussar OD må anvendes én gang forår, hvis der er behandlet med Hussar OD i efteråret.
- Hussar Plus OD må anvendes én gang forår, hvis der er behandlet med Hussar Plus OD i efteråret.
- Hvis der ikke er behandlet med Hussar i efteråret, er splitbehandling tilladt under forudsætningen, at begge sprøjtninger foretages med samme middel.

Enårig rapgræs gror stort set hele året. Særligt i 1. års marker, kan stor forekomst af enårig rapgræs genere afgrøden. Jo tidligere man får stoppet væksten af ukrudtsgræsset des bedre. Vi har erfaring for, at de tidlige behandlinger, er de mest effektive, og tillige de mest skånsomme overfor afgrøden. Væksten i bakkesvingel kan dog godt sættes i stå i en periode efter udsprøjtning af Hussar.

Hussar OD virker optimalt fra 8°C og anvendes, når ukrudtsplanterne er i vækst om foråret.

Valg af middel

Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse med op til 0,1 l pr. ha med mulighed for to behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 0,02 l Hussar OD i efteråret, er det tilladt at anvende op til 0,08 l Hussar OD om foråret. Er der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der behandles to gange om foråret med i alt 0,1 l pr. ha.

Hussar Plus OD er en kombination af aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD, og må anvendes i marts-april, hvis der ikke har været anvendt Hussar OD i efteråret.

Der må bruges i alt 0,14 l pr. ha Hussar Plus OD pr. vækstsæson. Er der anvendt 0,05 l Hussar Plus OD i efteråret, må der i foråret anvendes op til 0,09 l pr. ha i én behandling.

Ved ren forårsanvendelse må der anvendes op til 0,14 l Hussar Plus OD én gang eller som

splitsprøjtning med f.eks. 2 x 0,07 l Hussar Plus OD pr. ha. Ved kun en behandling anvendes normalt kun op til 0,09 l/ha.

Hussar Plus OD er afprøvet i Landsforsøgene og har en lidt bedre og mere holdbar effekt på enårig rapgræs end Hussar OD.

Hussar har også effekt på 2-kimbladet ukrudt som f.eks. kamille og fuglegræs.

Hussar OD må anvendes, men fremover vil midlet ikke blive markedsført af Bayer, og skal på sigt erstattes af Hussar Plus OD. Dvs. at den Hussar OD som kan anvendes i år, enten findes hos distributøren eller på landmandslager.

Anbefaling pr. ha

Uden Hussar OD i efteråret 2020:

Fra nu pr. ha:

0,03-0,04 l Hussar OD + 0,5 l olie

Ved behov 2-3 uger senere:

0,04-0,06 l Hussar OD + 0,5 l olie

ELLER

Fra nu pr. ha:

0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved behov 2-3 uger senere:

0,04-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved 0,02 l Hussar OD i efteråret 2020:

Fra nu pr. ha:

0,04-0,06 l Hussar OD + 0,5 l olie

Ved 0,05 l Hussar Plus OD i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,05-0,09 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Bemærk, at i ét vækstår må Hussar OD ikke anvendes i kombination med Hussar Plus OD. Den samme begrænsning gælder for bl.a. tribenuron-methyl produkter som Express m.fl.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF