

## Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2022

- Nyudlæg i ærter og vårbyg
- Opfølgning i vintersæd

### Bekæmpelse af ukrudt i dæksæd

#### Nyudlæg i ærter

Der sprøjtes med ca. 10-14 dages mellemrum med 2 x (0,5 l Stomp CS+ 0,4 l Fighter 480 pr. ha), eller 2 x (0,5 l Stomp CS + 0,75 l Basagran SG pr. ha).

1. sprøjtning udføres, når ukrudtet er på kimbladsstadiet.
2. sprøjtning udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet 10-14 dage efter.

#### Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af bakkesvingel. Her kan nævnes 0,075 l Primus, 0,5 l Primus XL, 0,8 l Starane XL, 0,25-0,6 l Catch, 0,5 l Zypar eller 0,5 l Mustang Forte pr. ha. Bemærk at dæksædshalm behandlet med Mustang Forte skal brændes, og at der er restriktioner i forhold til efterfølgende afgrøde.

Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt, der findes i marken.

#### Bekæmp enårig rapgræs i dæksæden

Mod enårig rapgræs hæves doseringen af DFF til 0,1 l pr. ha. DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Det er vigtigt ved anvendelse af DFF at græsfrøene er sået, dvs. dækket med mindst 1 cm jord, idet midlet ellers kan skade.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. Ha, og Hussar Plus OD med 0,05 l pr. ha. Midlerne anvendes i st. 12-29. Ud over en bred effekt mod bredbladet ukrudt, er der også effekt mod enårig rapgræs, vindaks og rajgræs. Der må ikke anvendes både Hussar og Express i samme vækstsæson.

#### MCPA

Kan anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 30-39. Husk stor vandmængde.

#### Primera Super/Foxtrot

Anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 1,0 l pr. ha.

#### Udlæg i vintersæd, opfølgning i foråret.

Praktiseres stort set ikke mere på grund af væselhaleproblemer.

Midler der kan anvendes er Express 50 SX, DFF, Starane XL, Mustang Forte.

Hussar OD (0,05 l pr. ha + olie) eller Hussar Plus OD (0,07 l pr ha) kan anvendes mod enårig rapgræs.

Primera Super/Foxtrot anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 0,8 l pr. ha.

Topik kan anvendes mod agerrævehale, alm. rapgræs og vindaks med 0,4 l pr. ha frem til stadie 29.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF