

Efterårsbehandling af bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 7, 2022

- **Markedssituationen betyder, at der skal ses kritisk på de nye udlæg**
- **Efterårsbehandling i frø- og udlægsmarken**
- **Gødskning**

Når dæksæden er høstet og halmen fjernet, skal stubben afpudses i en højde på ca. 5 cm, så de nye planter kan buske sig mest muligt. Afpudsning sikrer, at der kan komme mest mulig lys ned til de små planter. Udlæg sået i vintersæd kan have lange slaskede blade, og en dyb afpudsning stimulerer planten til at sætte nye friske blade og sideskud.

Det er bedst, når der er sat en så lav stub som muligt med mejetærskeren, men er der sat høj stub, skal man afpudse hurtigst muligt.

Er der mere materiale end det kan forsvinde mellem udlægsplanterne, bør det rives sammen og fjernes efter et par dages tørring.

Til svage nyudlæg anbefaler vi at tilføre 30 kg N/ha hurtigst efter høst.

Vurder markerne med hensyn til væselhale

Bakkesvingel konkurrerer ikke særlig godt med væselhale. Samtidig er væselhale vanskeligere at frarensse i bakkesvingel, end i rødsvingel på grund af mindre frøstørrelse i bakkesvingel.

Derfor skal man vurdere markerne kritisk, hvis væselhale er et problem, og ompløje om nødvendigt. Tag altid frøavlskonsulenten med på råd inden ompløjning iværksættes.

Afpudsning og afgræsning af flerårsmarker

Det er vigtigt at afpudse i bund, 3-5 cm's dybde lige efter høst. Denne afpudsning følges op i løbet af efteråret efter behov.

Er der for meget materiale til at det kan falde ned mellem planterne, bør det fjernes.

Normalt skal sidste afpudsning foretages ca. 1. oktober, men er det et mildt og fugtigt efterår, kan væksten i græsset fortsætte langt ind i november, så en afpudsning frem til midt i oktober kan være aktuelt. Sidste afpudsning skal være i en højde på ca. 10 cm.

Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ til mekanisk afpudsning. Vær opmærksom på, at der er får nok pr. ha, og anvend stribegræsning, så fårene får gjort arbejdet færdig i den gamle fold, inden de flyttes. Omkring 30 får pr. ha er passende.

Gødskning

I langt de fleste tilfælde gødes bakkesvingel efter sidste afpudsning i slutningen af september. Der gødes med 65-75 kg N pr. ha. Ved udlæg i ærter nedsættes mængden til ca. 50 kg N pr. ha.

I 1. års marker kan det være formålstjenligt at udbringe gødningen allerede nu, hvis afgrøden er lidt tynd og svag. Hvis marken ikke er i god vækst kan årsagen være N-mangel, og da bør kvælstoffet ikke tilføres sent.

Ved normale til høje P og K tal kan anvendes ren kvælstofgødning. Ved lave tal anvendes NPK gødning. Svovl skal ikke anvendes om efteråret, men først til foråret.

Gylle kan anvendes når fordelingen er optimal og det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan regnes med en 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammoniumkvælstof.

Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. oktober i græsfrømarker.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF