

Engrapgræsgalmyg


FrøavlsINFO nr. 6, 2022

- Tjek for engrapgræsgalmyg
- Sæt fangbakker ud nu
- Mange birkepollen = galmyggen flyver

Birken er så småt i gang med at blomstre og en god tommelfingerregel siger, at galmyggen flyver når birken blomstrer. Prognosen for engrapgræsgalmyggens flyvning viser, at flyvningen starter ud nu og i den kommende uge. Først i de sydlige og ikke kystnære egne. Derfor er det tid til at holde øje med engrapgræsgalmyggens flyvning i den enkelte engrapgræsmark.

Figuren nedenfor viser risikovurdering baseret på graddage. Kurverne siger noget om flyvetidspunkt, men ikke noget om forventet angrebsstyrke, og der kan være stor forskel fra mark til mark.

Den blå kurve viser 2022, og det fremgår at i forhold til 2021 er vi mindst 1 uge tidligere på vej i år. Klik på billedet herunder og indtast dit eget postnummer, for at se den forventede flyvekurve for din lokalitet.



Engrapgræsgalmyggen lægger æg i frøstænglen. Larvernes gnav i frøstænglen vil senere medføre udbyttetab pga. golde/dårligt udviklede frø.

Risikoen for mange galmyg er størst i områder, hvor der år efter år dyrkes engrapgræs, så her bør man have særlig opmærksomhed på denne skadevolder. Ældre marker er mere udsatte end 1. års marker.

Hvide fangbakker placeret i engrapgræsmarken er en stor hjælp til at følge flyvningen lokalt, så få nu sat fangbakker ud i jeres egne engrapgræsmarker.

En behandling med 0,15-0,2 kg/ha Lamdex kan beskytte engrapgræsplanten mod angreb i ca. 10 dage lidt afhængig af væksten i afgrøden.

En opfølgende behandling kan være aktuel, hvis der fanges mange galmyg i marken. Flyvninger af galmyg i slutningen af maj forventes ikke at kunne skade dette års høst af engrapgræs, men kan være opformering til en generation engrapgræsgalmyg i efteråret.

Se billeder på næste side →

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF



Plastbakke med vand + en dråbe sulfo udsat i engrapgræsmark.



Masser af små galmyg, ca. 2mm store, fra fangbakke placeret i en 2. års engrapgræs. Ikke alle typer galmyg skader engrapgræs.



Den rigtige engrapgræsgalmyg er behåret på vingerne og er lidt større end svampemyggen.



Svampemyggen - laver ikke skader i engrapgræs.