

Etablering af hundegræs

FrøavlsINFO nr. 3, 2022

- Udlæg i byg er en sikker metode
- Varm jord giver hurtig fremspiring

Forudsætninger for udlæg

Hundegræs lykkes bedst på lermuldede jorder i god kultur. Sandmuldede jorder er mindre egnede, da hundegræs i frøavl er noget følsom over for tørke.

Hundegræs er også følsom over for sen nattefrost. Derfor bør hundegræs placeres i kystnære egne, hvor risikoen for nattefrost i det sene forår er minimal.

Af ukrudtsarter, der ikke lader sig rense fra hundegræs, kan nævnes kvik, rajgræs og agerrævehale. Ukrudtsarter der er vanskelige at rense fra er enårig og alm. rapgræs, kamille, skræppe, haremad og blød hejre.

Udlæg af hundegræs

Bedste metode her i foråret er udlæg i vårbyg. Vælg så vidt mulig en stråstiv vårbygssort med lav tendens til aks- og strånedknækning.

Der er stor forskel på bygsorternes egenskaber til udlæg, se evt. mere på sortinfo.dk.

Der udsås 3-5 kg hundegræs pr. ha. Ved højere udsædsmængde risikerer man, at marken bliver for tæt, især til 2. og evt. 3. års høst.

Vi tilstræber 100-125 planter pr. m², men hvis

planterne er jævnt fordelt, kan 50-60 planter pr. m² være tilstrækkeligt.

Udlægget skal sås samtidigt med eller straks efter såning af dæksæden. Frøet placeres i 1-2 cm's dybde, og det er vigtigt, at frøene får kontakt med fast og fugtig jord.

Rækkeafstand og såudstyr

Mange såmaskiner giver mulighed for skiftevis at så hundegræs og korn på hver 2. tragt, hvilket giver de enkelte planter mere lys og plads og generelt bedre udviklingsmuligheder.

Dette system fungerer meget fint i praksis med minimale ompløjningsprocenter som resultat.

3 kg udsæd pr. ha vil ofte være nok når man sår på hver 2. række.

Såning på dobbelt rækkeafstand, hvor resultatet er kraftige rækker af henholdsvis byg og udlæg, giver også optimal konkurrence mod enårig og alm. rapgræs, som ellers kan hæmme hundegræsset.

Tidlig ukrudtsbekæmpelse

Mod enårig rapgræs kan der 1-3 dage efter såning behandles med 0,1 l DFF pr. ha. Dette forudsætter at hundegræsfrøene alle er dækket af jord. Behandlingen kræver desuden god jordfugtighed. Tromling skal ske inden behandling med DFF.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF