

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2022

- **Udlæg i ærter og i vårbyg**
- **Opfølgning, udlæg i vintersæd**

Udlæg i ærter

Anvend Stomp CS + Fighter 480 med 10 - 14 dages mellemrum.

1. behandling: 0,4 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet.
2. behandling: 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet.

Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l pr. ha Fighter 480 i split og 1,0 l pr. ha såfremt behandlingen ikke deles.

Ved anvendelse af Stomp CS skal rødsvingel frøene være dækket af mindst 1 cm jord.

Udlæg i vårbyg

Mod enårig rapgræs

DFF kan anvendes med op til 0,1 l pr. ha umiddelbart efter såning på fugtig jord. Sørg for at rødsvingel frøene er dækket af mindst 1 cm jord for at undgå skade. Ved større nedbørsmængder umiddelbart efter behandlingen, kan rødsvingel skades af DFF.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. ha og Hussar Plus OD med 0,05 l pr. ha mod fremspiret enårig rapgræs samt vindaks og rajgræs. Begge midler har også bred effekt på tokimbladet ukrudt. Begge midler tilsættes 0,5 l olie pr. ha.

Mod tokimbladet ukrudt

Hvis der er anvendt DFF lige efter såning, kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Zypar, Catch, Starane XL og/eller Express SX.

7,5 g Express SX i blanding med enten 0,075 l Primus (specielt kamille) eller 0,5 l Zypar (specielt hundepersille og storkenæb) pr. ha, har bred effekt mod tokimbladet ukrudt.

Tidsler bekæmpes bedre med 0,4 - 0,6 l Catch eller 0,5 l Mustang Forte pr. ha, sammen med Express. Tidslerne skal være godt fremme på behandlingstidspunktet.

Uddybende info om anvendelse af Mustang Forte findes på [Middeldatabasen](#).

Hvis ikke der er anvendt DFF ved såning, kan der tilsættes 0,05 l DFF pr. ha til at forstærke effekten mod agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand.

DFF må kun anvendes én gang pr. sæson. Produkter med aktivstofferne i Hussar og Express må ikke anvendes i samme vækstår.

Der er konstateret resistens af Hussar over for enårig rapgræs, så anvend kun Hussar, hvor fremspiret græsukrudt skal bekæmpes.

Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge herbicid-resistens.

Mod tidsler - MCPA

MCPA anvendes mod rodokrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 20-39. Bedst effekt ved min. 20°C, stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed.

Træk behandlingen til der er adskillige grønne blade på tidslerne.

Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt kan anvendes i selve frømarken.

Primera Super/Foxtrot

Kan med 0,8 l pr. ha anvendes mod flyvehavre og agerrævehale frem til stadie 29.

Udlæg i vintersæd, opfølgende behandling i foråret

Express SX anvendes mod nyt ukrudt med 7,5 g pr. ha evt. i blanding med 0,05 l pr/ha DFF. Mod mange burresnerre eller store kamiller kan suppleres med 0,75 l Zypar eller 0,75 l Starane XL pr. ha. 0,75 l Mustang Forte pr. ha er velegnet til frøukrudt og tidsler.

Mod enårig rapgræs i vinterbyg anvendes Hussar OD med 0,025 l eller Hussar Plus OD med 0,035 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha. I hvede anvendes Hussar OD 0,05 l eller Hussar Plus OD 0,07 l pr. ha + olie. Hussar har effekt mod enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs og tokimbladet ukrudt.

I denne gruppe midler (Express SX, Trimmer, Nuance, Hussar) må man kun anvende ét af midlerne én gang pr. vækstår.

Mod agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs kan anvendes Topik 0,4 l pr. ha frem til stadie 29 eller 0,8 l Primera Super pr. ha frem til stadie 39.

Venlig hilsen
DLF
Avlsafdelingen