

Efterårsbehandling af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 9, 2022

- Klarer udlægget sig
- Efterårsbehandling i frø- og udlægsmark
- Kvælstof til svage udlæg

Mange udlægsmarker kom godt fra start, mens andre fik kraftig nedbør imellem såning og fremspiring. Efterfølgende relativt tørre forhold har i nogle tilfælde efterladt svage udlæg.

Under tørre og solrige forhold, kan blotlægning af små udlægsplanter efter en tæt dæksæd, være en udfordring for rødsvingeludlæg. Ligeledes er lejesæd i dækafgrøden bestemt heller ikke ønskelig. De fleste har dog været påpasselige med at undgå lejesæd i dækafgrøderne i år.

Er udlægsplanterne små, kan man overveje en lidt længere stub, der kan skygge for udlægget i den første tid, hvis ikke der er udsigt til regn. Men stubben skal senere afpudses, så snart vandforsyningen er i orden.

Lige efter høst af dæksæden er der ikke de store krav til udlægsplanternes størrelse, men planterne skal være jævnt fordelt over hele arealet, også for ikke at give plads til fremspiring af væselhale.

Det er de finere rødsvingeltyper, det går værst ud over, når dæksæden er kraftig. Tjek udlægget så snart dæksæden er høstet og kontakt din konsulent, så i sammen kan vurdere, om udlægget er værd at gemme på.

Efterårsbehandling forud for 1. høstår

Stubben fra dæksæden skal pudses i bund i 4-5 cm højde, så udlægsplanterne kan buske sig. Afpudsningen reducerer stubbens skyggevirkning, så der i efteråret kan komme mest mulig lys ned til skuddene. Afklipping af lange slaskede blade, stimulerer planterne til at lave rødder og sætte nye friske, korte blade og sideskud, som giver flere og kraftigere frøstængler i 2022.

I kraftige udlæg sættes der kortest mulig dæksædsstub, der må ikke ligge mere materiale tilbage efter afpudsningen, end hvad der kan få jordkontakt og forsvinde mellem udlægsplanterne.

Til svage udlæg anbefales at tilføre 25 kg N/ha snarest efter høst af dæksæden.

Rødsvingel efter 1. høstår

1 l pr. ha [Stomp](#) og/eller 1,5 l pr. ha [Boxer](#) (pas på afdrift og/eller fordampning) kan reducere niveauet af væselhale. Men midlerne skal anvendes som jordmidler, når de nyfremspirede planter har max. 1 - 2 blade.

Pas på afdrift og fordampning, dagtemperaturen skal under 15 grader og bedste effekt opnås på fugtig jord.

Som supplement til græsukrudsbehandling har [Mateno Duo](#) fået en godkendelse til mindre anvendelse i frøgræs. Produktet har god effekt på nyfremspiret væselhale men påvirker også rødsvingelplanterne, små planter mest. Produktet må anvendes med op til 0,7 l/ha én gang pr vækstsæson efter høst af dæksæden. Produktet anvendes når de første væselhaleplanter er fremspiret og står på kimbladstadiet meget gerne på fugtig jord. Effekten forstærkes hvis udsprøjtning kan ske sammen med Boxer (dagtemperaturer under 15 grader).

Produkter indeholdende aktivstoffet diflufenican (som f.eks. Matheno Duo og DFF), må kun anvendes en gang pr. vækstsæson.

Afpudsning og afgræsning

Hvis den gamle frømark ikke er afbrændt, er det vigtigt, at der pudses helt i bund, gerne ned til 2 - 3 cm højde. Denne afpudsning foretages bedst med en slagleklipper. Skiveslåmaskinen er også god til at slå i bund, men skiveslåmaskinen lægger det afklippede materiale oven på planterne, og det bevirker, at materialet har svært ved at blive omsat. Første afpudsning følges op med afpudsning(er) i 6 - 8 cm's højde et par gange i løbet af efteråret i forhold til nedbør og behov. Der må ikke være mere materiale, end det kan forsvinde ned mellem planterne og omsættes inden vinteren. Er der for meget materiale, er det nødvendigt at rive det sammen og fjerne det.

Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ til mekanisk afpudsning. Her er det stadig vigtigt, at gammel stub er afbrændt eller slået af straks efter høst. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig mange får, ca. 30 stk./ha og anvend gerne sribegræsning, så fårene får gjort arbejdet færdigt, inden de flyttes videre. Sen afgræsning må ikke efterlade græsset kortere end 7 - 8 cm's højde i november.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF