

Ukrudtsbekæmpelse i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2022

- Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
- Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på problemukrudt

Bekæmp det 2-kimbladet ukrudt nu

De ukrudtsplanter der har overlevet efterårets behandlinger er allerede store nu, så krav til effekt overfor 2-kimbladet ukrudt er høj. Derfor er det vigtigt at få udført behandlingen nu.

Vendt ikke på evt. tidsforekomst. Disse må der tages stilling til senere i vækstsæsonen.

DFF

DFF produkterne må kun anvendes én gang pr vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, er DFF en vigtig blandingspartner til de efterfølgende løsninger, mod nyfremspirende enårig rapgræs. Der er også god effekt på agerstedmoder, rødtvetand og ærenpris.

Er det kun 2-kimbladet ukrudt der skal bekæmpes i kombination med et andet middel, anvendes den lave dosering.

0,05 - 0,1 l DFF pr. ha

Zypar

Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zypar er aktuel fra nu. Zypar har speciel god effekt på hundepersille, storkenæb, lægejordrøg og lancetbladet vejbred, men bekæmper også kamille og de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter.

0,75 - 1,0 l Zypar pr. ha

Catch

Catch giver en god og billig ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burrenerre og kornblomst. Kamille og storkenæb bekæmpes kun inden planterne bliver for store, så løsningen er aktuel primo april. En god blandingspartner kunne være 0,07 l Primus pr ha.

0,6 l Catch pr. ha

Starane XL

Er hovedproblemet burrenerre og skræpper er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er mindst 10-15°C, hvilket gør, at behandlingen trækkes til temperaturen er tilstede typisk i april. Løsningen er relativ dyr.

1,5 l Starane XL pr. ha

Ariane FG S

Ariane FG S er primært interessant mod tidsler. Ariane kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års marker og i ældre marker med op til 3 l pr. ha. En dosering på 1,5 l pr ha vil ofte være tilstrækkeligt overfor tidsler, hvis det er en opfølgende behandling. Temperaturkravet er på mindst 15°C.

Mod tidsler 1,5 - 1,75 l Ariane FG S pr. ha

Primera Super mod græsukrudt

Med Primera Super/Foxtrot har vi mulighed for at begrænse vindaks, agerrævehale, flyvehavre og alm. rapgræs i strandsvingel.

Vær specielt opmærksom i ældre frømarker, hvor problemet med alm. rapgræs ofte er størst.

Der skal behandles i april ved gode vækstbetingelser og 15-20°C. Undgå at behandle strandsvingel, hvis den er tørkestresset, da det kan påvirke afgrøden for meget.

0,8 l Primera S pr. ha eller

0,5 l Foxtrot pr. ha

der tilsættes 0,1 l sprede klæbemiddel pr.100 l vand

Følgende midler er godkendt til mindre anvendelse i strandsvingel, og vejledningen for de enkelte midler kan findes her [DFF](#), [Zypar](#), [Catch](#), [Primera Super](#), [Foxtrot](#) eller på [Middeldatabasen](#).

Weed-wiper

Det er muligt at låne en 12 m weed-wiper til frømarker mod græsukrudt, korn, eller afvigende planter, som kan give problemer. Men for at weedwiperen kan anvendes kræves en højdeforskel på mindst 15 cm mellem afgrøde og ukrudt.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF