

Anvendelse af Kerb i hundegræs

FrøavlsINFO nr. 1, 2023

- **Kerb 400 SC er godkendt til anvendelse i hundegræs udlagt i dæksæd, fra midt i februar til 1. marts, med en dosis på 0,2 til 0,3 l pr. ha**

Er der på nuværende tidspunkt meget enårig eller alm. rapgræs i hundegræsmarken er eneste mulighed for bekæmpelse en anvendelse af Kerb 400 SC. Det er kun i marker eller områder med en betragtelig bestand af ukrudtsarterne, at behandling er tilrådeligt. Vurdering af vejrforholdene på sprøjetidspunktet er vigtig, da der er risiko for skade på afgrøden. Behandling i en kold periode med lav jordtemperatur sammen med store mængder nedbør, forstærker virkningen, og dermed også en eventuel skade på afgrøden.

Forsøg med Kerb 400 SC

DLF har i 2015 og 2016 udført forsøg med Kerb 400 SC i hundegræs. Forsøgene viser, at der ved korrekt anvendelse er muligt at reducere bestanden af alm. rapgræs, uden at det går ud over udbyttet. Der har i gennemsnit over to års forsøg ikke været udbyttenedgang for behandling sidst i februar med 0,2 eller 0,4 l Kerb 400 SC pr. ha.

Du kan læse mere om DLF forsøg med Kerb 400 SC i [ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2016/2017](#) side 17.

Virkemåde

Kerb 400 SC optages og virker gennem rødderne. Derfor vil udsprøjtning på en dag med fugtigt vejr fremme nedtrængningen i jorden og dermed også virkningen. Påvirkningen af hundegræs vil være størst i et svækket/svagt udlæg, da roddybden er reduceret og Kerb 400 SC virker stærkest i det øverste jordlag.

Anbefaling:

- **Kerb 400 SC anvendes hvor der er en stor bestand af alm. rapgræs/enårig rapgræs**
- **Der anvendes 0,2 - 0,3 l Kerb 400 SC pr. ha ultimo februar**

Restriktioner

- Kerb 400 SC's godkendelse i hundegræs er til mindre anvendelse, hvilket betyder at midlet benyttes på eget ansvar
- Halm må efterfølgende ikke anvendes til opfodring
- Brugsanvisningen kan downloades [her](#)

Anvendelse af Kerb til rækkesprøjtning

Hvis man har udsået sit frø på rækker og har mulighed for afskærmet rækkesprøjtning, er Kerb 400 SC godkendt til dette formål på en godkendelse til mindre anvendelse. Der må max anvendes 1 l pr. ha udbragt mellem rækkerne i perioden 1. november til 1. marts. Brugsanvisningen til mindre anvendelse kan downloades [her](#).

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF