

Ukrudtsbekæmpelse i ital. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2023

- **Flere gode muligheder for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt**
- **Vælg ukrudtsmiddel efter den aktuelle ukrudtsbestand**
- **Timing af behandlingen er vigtig**

Det er nu tid til at få et overblik over ukrudtsproblemerne i frømarken, for at få valgt den bedste løsning til den aktuelle ukrudtsbestand. I nogle renbestandsmarker, hvor der ikke er bekæmpet ukrudt i efteråret, kan ukrudtet være vokset godt til. Derfor skal disse marker behandles tidligt.

Fælles for de fleste midler, der kan anvendes i foråret er en svaghed overfor agerstedmoder og ærenpris. Derfor tilsættes 0,05 l DFF pr. ha. Vær opmærksom på at DFF kun må anvendes en gang i en vækstsæson, så hvis der har været anvendt DFF i efteråret, udelukker det anvendelse i foråret.

Primus/Saracen

Indeholder udelukkende aktiv-stoffet florasulam, og kan bruges tidligt.

0,075 l Primus/Saracen + 0,05 l DFF pr. ha

Catch, og Starane XL indeholder florasulam i blanding med et andet aktivstof, hvilket giver en bredere effekt. Samtidig er blandinger en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt 3 løsninger til forskellige situationer.

Catch

En løsning med Catch giver en god bred ukrudtsbekæmpelse.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Catch har en vis effekt på tidsler, men ikke på højde med Ariane FG S. Anvendes fra primo april.

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha

Ariane FG S

Kan anvendes i 1. års marker med op til 2,5 l pr. ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,0 l pr. ha. Er særlig aktuell, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkrav mindst 10-12°C.

Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en allround løsning mod frø- og rodukrudt. Er god ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj. Ariane FG S er det dyreste middel, men brug det, hvis tidsler er et problem.

**2,5 l Ariane FG S pr. ha eller
1,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha**

Starane XL

Er det Storkeæb og Hejreæb der er hovedproblemet er der en god mulighed i Starane XL. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til sidst i april.

1,5 l Starane XL + 0,05 l DFF pr. ha

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor-use. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes her:

[DFF](#) og [Catch](#)