

Hussar i rødsvingel mod enårig rapgræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2023

- **Hussar OD må anvendes én gang forår, hvis der er behandlet med Hussar OD i efteråret.**
- **Hussar Plus OD må anvendes én gang forår, hvis der er behandlet med Hussar Plus OD i efteråret.**
- **Hvis der ikke er behandlet med Hussar i efteråret, er splitbehandling tilladt under forudsætningen, at begge sprøjtninger foretages med samme middel.**

Enårig rapgræs gror stort set hele året. Særligt i 1. års marker og specielt i rødsvingel sorter uden udløbere, kan stor forekomst af enårig rapgræs genere rødsvinglen. Vi har erfaring for, at de tidlige behandlinger med Hussar i rødsvingel er de mest effektive og tillige de mest skånsomme overfor afgrøden. Rødsvinglens vækst kan godt sættes i stå i en periode efter udsprøjtning af Hussar.

Hussar OD virker optimalt fra 8°C og anvendes, når ukrudtsplanterne er i vækst om foråret.

Valg af middel

Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse med op til 0,1 l pr. ha med mulighed for to behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 0,02 l Hussar OD pr. ha i efteråret, er det tilladt at anvende op til 0,08 l Hussar OD pr. ha om foråret. Er der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der behandles to gange om foråret med i alt 0,1 l pr. ha.

Hussar Plus OD, er en kombination af aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD, og må anvendes i marts-april, hvis der ikke har været anvendt Hussar OD i efteråret.

Der må bruges i alt 0,14 l Hussar Plus OD pr. ha pr. vækstsæson. Er der anvendt 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha i efteråret, må der i foråret anvendes op til 0,09 l pr. ha i én behandling.

Ved ren forårsanvendelse anvendes 0,05-0,14 l Hussar Plus OD pr. ha én gang eller som splitsprøjtning med f.eks. 2 x 0,07 l Hussar Plus OD pr. ha.

Én behandling i rødsvingel om foråret vil dog oftest være tilstrækkelig.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Hussar Plus OD er afprøvet i Landsforsøgene og har en lidt bedre og mere holdbar effekt på enårig rapgræs end Hussar OD.

Hussar har også effekt på 2-kimbladet ukrudt som f.eks. kamille og fuglegræs.

Anbefaling pr. ha

Uden Hussar OD i efteråret 2022:

Fra nu pr. ha:

0,03-0,04 l Hussar OD + 0,5 l olie

Ved behov 2-3 uger senere:

0,04-0,06 l Hussar OD + 0,5 l olie

ELLER

Fra nu pr. ha:

0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved behov 2-3 uger senere:

0,04-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved 0,02 l Hussar OD i efteråret 2022:

Fra nu pr. ha:

0,04-0,06 l Hussar OD + 0,5 l olie

Ved 0,05 l Hussar Plus OD i efteråret 2022:

Fra nu pr. ha:

0,05-0,09 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

DFF kan kombineres med Hussar, med en dosering på op til 0,15 l DFF pr. ha. DFF's jordeftekt kan forebygge mod nyfremspiring af enårig rapgræs i områder uden plantedække, f.eks. i 1. års marker. Agerstedmoder og i nogen grad ærenpris kan bekæmpes med 0,05 l DFF pr. ha.

DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Bemærk, at i samme vækstår må Hussar OD ikke anvendes i kombination med Hussar Plus OD. Den samme begrænsning gælder for bl.a. tribenuron-methyl produkter som Express m.fl.

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.