

Efterårsbehandling i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 8, 2023

- Efterårsbehandling
- Gødskning
- Ukrudtsbekæmpelse

Afpudsning af stub

Efter høst af dæksæd er det vigtigt at de nye planter busker sig mest muligt, så dæksædsstubben skal pudses i bund i en højde på ca. 5 cm. Afpudsningen stimulerer planten til at sætte nye friske blade og sideskud.

Er der undtagelsesvis mere materiale, end det kan forsvinde mellem udlægsplanterne, bør det rives sammen og fjernes.

Strandsvingel efter 1. års høst.

Hvis frøgræshalmen er snittet, vil en dyb afpudsning af stubben sørge for en yderligere findeling og fordeling af halm og stubrester. Når halmen nedbrydes i løbet af efteråret frigives 25 - 30 kg N pr. ha.

Strandsvingel må ikke gå vinteren i møde med for lille bladmasse, så omkring den 10. oktober kan den afpudses for sidste gang i 10-12 cm's højde, netop i en højde så bladene ikke bukker nedad ved indgangen til vinter.

I fodertyperne kan det være aktuelt at gøde lige efter høst og efterfølgende tage et slæt; men ikke senere end den 20 september.

Afgræsning med får er en udmærket måde at få marken afpudset, men metoden kræver det rigtige management. Fårene må ikke afgræsse afgrøden for tæt og sent.

Gødskning

Svage nyudlæg og plænesorter tilføres 25 kg N pr. ha så snart dæksæden er høstet.

Der gødes færdig først i oktober med i alt op til 100 kg N pr. ha efter korn.

2. års marker gødes efter sidste afpudsning. I plænetyperne kan man eventuelt dele kvælstoffet, 25 kg N pr. ha først i september og 75 kg N pr. ha i oktober.

Kvælstofnormen til strandsvingel er 200 kg N pr. ha til høst 2024 (150 kg N pr. ha på JB 11).

Ved efterslæt & afgræsning, se: landbrugsstyrelsens [Vejledning om gødsknings- og harmoniregler](#).

Gylle kan anvendes i efteråret, og der kan regnes med en 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammoniumkvælstof, såfremt der kommer nedbør efter udkørsel. Tjek evt. effekten i forhold til vejr og udbringningsteknik på [gylleeffekt](#). Gyllen skal udbringes senest den 15. oktober på frøgræsmarker.

Bekæmpelse af bredbladet ukrudt

Ukrudt kan bekæmpes i september med f.eks. 7,5 g Express 50 SX pr. ha + spredklæbemiddel mod kamiller, fuglegræs og korsblomstrede arter. I første årsmarker med agerstedmoder, tvetand og ærenpris tilsættes 0,05 l DFF pr. ha, ønsker man også effekt på nyfremspiret enårig rapgræs øges doseringen af DFF med op til 0,15 l pr. ha. For at opnå den ønskede jordvirkning og dermed ukrudtseffekt, behandles på fugtig jord, og jorden må ikke være dækket af afpudset plantemateriale.

Græsukrudt og spildkorn med 1-2 blade

Spildkorn og hejre kan bekæmpes/reduceres i strandsvingel med op til 0,12 l Agil pr. ha + spredklæbemiddel. Strandsvingel kan skades af Agil ved høje temperaturer, også i dagene efter behandlingen.

- Over 15°C: 0,1 l Agil pr. ha,
- Over 20°C: maks. 0,08 l Agil pr. ha
- Over 23°C: udsæt behandlingen

Undgå nattefrost i forbindelse med Agil behandling.

Der er tendens til at fodertyperne er mere følsomme for Agil end plænetyperne.

Stomp CS er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs med 1,0 l/ha og har nogen effekt mod rapgræs og væselhale. Behandl på fugtig jord før ukrudtets fremspiring.

Som supplement til græsukrudtsbekæmpelsen har [Mateno Duo](#) fået en godkendelse til mindre anvendelse i frøgræs. Produktet har god effekt på nyfremspiret væselhale, men vi har **ingen erfaringer** med anvendelse i strandsvingel, så test kun midlet på forpløjninger og lignende steder. Produktet må anvendes med op til 0,7 l pr. ha én gang pr. vækstsæson efter høst af dæksæden. Produktet anvendes når de første væselhaleplanter er fremspiret og står på kimbladstadiet meget gerne på fugtig jord. Effekten forstærkes hvis udsprøjtning kan ske sammen med Stomp.

Topik er godkendt til mindre anvendelse i strandsvingel og har nogen effekt overfor alm. rapgræs, alm. og ital. rajgræs samt agerrævehale. Der anvendes 0,3 l Topik + 0,5 l Renol pr. ha tidligt i september måned.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF