

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2024

- **Nyudlæg i ærter og vårbyg**
- **Bekæmpelse af enårig rapgræs og tidsler starter i dækafgrøden**
- **Opfølgning i vintersæd**
- **Mustang Forte er stærk mod tidsler**

Bekæmpelse af ukrudt i dæksæd

Nyudlæg i ærter

Der sprøjtes med ca. 10-14 dages mellemrum med 2 x (0,5 l Stomp CS+ 0,4 l Fighter 480 pr. ha).

1. sprøjtning udføres, når ukrudtet er på kimbladsstadiet.
2. sprøjtning udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet 10-14 dage efter.

Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af bakkesvingel. Her kan nævnes 0,075 l Primus, 0,5 l Primus XL, 0,8 l Starane XL, 0,25-0,6 l Catch, 0,2 l Pixxaro EC, 0,5 l Zypar eller 0,5 l Mustang Forte pr. ha. Bemærk at dæksædshalm behandlet med Mustang Forte skal brændes, og at der er restriktioner i forhold til efterfølgende afgrøde.

Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt, der findes i marken.

Bekæmp enårig rapgræs i dæksæden

Mod enårig rapgræs hæves doseringen af DFF til 0,1 l pr. ha. DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Det er vigtigt ved anvendelse af DFF at græsfrøene er sået, dvs. dækket med mindst 1 cm jord, idet midlet ellers kan skade.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. ha, og **Hussar Plus OD** med 0,05 l pr. ha. Midlerne anvendes i st. 12-29. Ud over en bred effekt mod bredbladet ukrudt, er der også effekt mod enårig rapgræs, vindaks og rajgræs. Der må ikke anvendes både Hussar og Express i samme vækstsæson.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Bekæmpelse af rodukrudt i korn

MCPA kan anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 30-39. Husk stor vandmængde.

Mustang Forte er stærk mod agertidsler, men skal anvendes senest ved byggens stadie 32. Mustang Forte må anvendes med op til 0,75 l pr. ha i vårbyg. I forbindelse med anvendelse af Mustang Forte er der flere restriktioner, som fremgår af [etiketten](#).

Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt kan anvendes i selve frømarken.

Primera Super/Foxtrot

Anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 1,0 l pr. ha.

Udlæg i vintersæd, opfølgning i foråret.

Praktiseres stort set ikke mere på grund af væselhaleproblemer.

Midler der kan anvendes i hveden om foråret mod tokimbladet ukrudt er følgende:

Express 50 SX, DFF, Starane XL, Pixxaro EC, Zypar eller Mustang Forte.

Hussar OD (0,05 l pr. ha + olie) eller Hussar Plus OD (0,07 l pr. ha) kan anvendes mod enårig rapgræs.

Primera Super/Foxtrot anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 0,8 l pr. ha.

Topik kan anvendes mod agerrævehale, alm. rapgræs og vindaks med 0,4 l pr. ha frem til stadie 29.