

Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 4, 2024

- **Hussar OD eller Hussar Plus OD, god mod enårig rapgræs**
- **Ariane FG S, stærk mod tidsler**

Der har igen i år været rigtig god effekt af de tidlige Hussar behandlinger mod enårig rapgræs. Det vil dog i nogle tilfælde, være nødvendigt med en opfølgende behandling, se [FrøavlsINFO nr. 1](#). Tag gerne din frøavlskonsulent med på råd, når sprøjteplanen skal fastlægges.

I de korte engrapgræssorter kan en weed-wiper hjælpe mod alm. rapgræs, hejre, kvik og andet ukrudt, der er højere end engrapgræsset. Resten må klares med håndlugning, pletsprøjtning eller fraskæring til høst. Kontakt din frøavlskonsulent, hvis du ønsker at låne en 12 m weed-wiper.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Har der tidligere været anvendt Hussar, vil der sjældent være behov for yderligere bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, bortset fra skræpper og tidsler på et senere tidspunkt. I de situationer hvor der er tilbageværende tokimbladet ukrudt er følgende midler mulige valg:

DFF

Må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, er DFF en vigtig blandingspartner til de efterfølgende løsninger, mod nyfremspirende enårig rapgræs, hvis der er åbne områder i plantebestanden. Der er også god effekt på agerstedmoder, rødtvetand og ærenpris. Er det kun tokimbladet ukrudt der skal bekæmpes i kombination med et andet middel, anvendes den lave dosering.

0,05 - 0,1 l DFF pr. ha.

Zypar

Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zypar er aktuell fra nu. Zypar har speciel god effekt på hundepersille, storkenæb, lægejordrøg og lancetbladet vejbred, men bekæmper også kamille og de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. Sidste frist for anvendelse er st. 32, ca. medio april.

0,75 – 1,0 l Zypar pr. ha.

Catch

En god og billig ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burrenerre og kornblomst. Kamille og storkenæb bekæmpes kun inden planterne bliver for store, så løsningen er aktuell primo april. En god blandingspartner kunne være 0,05 l Primus pr. ha ved forekomst af stort ukrudt.

0,6 l Catch pr. ha

Starane XL

Er hovedproblemet burrenerre og skræpper er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er mindst 10-15°C, hvilket gør, at behandlingen trækkes til temperaturen er tilstede typisk i april. Løsningen er relativ dyr.

1,5 l Starane XL pr. ha.

Ariane FG S

Ariane FG S er primært interessant mod tidsler. Ariane kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års marker udlagt i korn og i ældre marker med op til 3,0 l pr. ha. En dosering på 1,5 l pr. ha vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt overfor tidsler, hvis det er en opfølgende behandling efter tidligere Hussar sprøjtninger, der kun sætter tidslerne tilbage. Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en allround løsning mod frø- og rodukrudt på et relativt sent tidspunkt i vækstsæsonen. Temperaturkravet er på mindst 15°C.

Mod tidsler 1,5 – 1,75 l Ariane FG S pr. Ha
Bred løsning 1,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha

Bekæmpelse af rodukrudt

Skræpper, agertidsler og haremader starter væksten sent i foråret. Tidsler og skræpper er især et problem i engrapgræs efter hvidkløver. På nogle eksportmarkeder er der nul-tolerance over for skræpper i engrapgræs. Så skræpper skal altid bekæmpes 100 pct.

[Catch](#), [Zypar](#), [DFF](#), [Hussar OD](#) og [Hussar Plus OD](#) er godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF