

Ukrudtsbekæmpelse i engsvingel

FrøavlsINFO nr. 3, 2024

- Tokimbladet ukrudtsbekæmpelse i engsvingel bekæmpes fra nu
- Ingen mulighed for bekæmpelse af etableret græsukrudt

Bekæmp det 2-kimbladet ukrudt nu

Engsvingel er en ret dårlig konkurrent specielt første høstår, og ukrudtsplanter der har overlevet efterårets behandlinger er allerede store, så krav til effekt overfor 2-kimbladet ukrudt er høj. Derfor er det vigtigt at få udført behandlingen nu. Vær opmærksom på at flere af de gængse 2-kimbladede ukrudtsmidler ikke er godkendt til anvendelse i engsvingel.

Vendt ikke på evt. tidsforekomst. Disse må der tages stilling til senere i vækstsæsonen.

DFF

DFF produkterne må kun anvendes én gang pr vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, er DFF en vigtig blandingspartner til de efterfølgende løsninger, mod nyfremspirende enårig rapgræs. Det er også det mest effektive produkt mod agerstedmoder og ærenpris. Er det kun tokimbladet ukrudt der skal bekæmpes i kombination med et andet middel, anvendes den lave dosering.

DFF 0,05 - 0,15 l pr. ha

Catch

Catch giver en god og billig ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burrester og kornblomst. Kamille og storkenæb bekæmpes kun inden planterne bliver for store, så løsningen er aktuel fra nu. En god blandingspartner kunne være 0,05 l Primus pr. ha. ved forekomst af stort ukrudt.

Catch 0,6 l pr ha

Starane XL

Er hovedproblemet burrester og skræpper er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er mindst 10-15°C, hvilket gør, at behandlingen trækkes til temperaturen er tilstede typisk i april. Løsningen er relativ dyr.

Starane XL 1,5 pr. ha

Ariane FG S

Ariane FG S er primært interessant mod tidsler. Ariane kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års marker og i ældre marker med op til 3 l pr. ha. En dosering på 1,5 l pr. ha vil ofte være tilstrækkeligt overfor tidsler, hvis det er en opfølgende behandling. Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en allround løsning mod frø- og rodukrudt på et relativt sent tidspunkt i vækstsæsonen. Temperaturkravet er på mindst 15°C.

Mod tidsler 1,5 – 1,75 l Ariane FG S pr. Ha
Bred løsning 1,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha

Følgende midler er godkendt til mindre anvendelse i engsvingel, og vejledningen for de enkelte midler kan findes her [DFF](#), [Catch](#) eller på [Middeldatabasen](#).



Fuglegræs i 1. års Senu engsvingel

Græsukrudt

Til bekæmpelse af græsukrudt i engsvingel, er der desværre ingen godkendte midler til rådighed, hvorfor græsukrudtsbekæmpelse ikke er en mulighed i engsvingel.

Er der områder af marken med forurening af f.eks. rajgræs eller blød hejre, bør områderne ikke høstes til frø, da frørensning stort set er umulig.

Weed-wiper

Det er muligt at låne en 12 m weed-wiper til frømarker mod græsukrudt, korn o.l. Men for at weedwiperen kan anvendes, kræves en højdeforskel på mindst 15 cm mellem afgrøde og ukrudt.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF