

Vækstregulering og svampebekæmpelse i engsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2024

- **Vækstregulering aktuelt i den kommende periode**
- **Svampebekæmpelse**

Det absolut bedste udgangspunkt for et godt udbytte, er at engsvinglen står op ved blomstring. Men det er ligeledes vigtigt, at engsvinglen står op i frøfyldningsperioden frem til skårlægning. Vækstregulering af engsvingel skal udføres under hensyntagen til afgrødens tilstand og vækst. Da engsvingel er meget spildsom, er det vigtigt at afgrøden skårlægges, hvis afgrøden står op til høst.

Der kan anvendes op til 1,2 l Cuadro NT pr. ha eller Moddus start. Deles vækstreguleringen må Moddus Start anvendes med op til 1,6 l pr. ha. Moddus M må fortsat kun anvendes med op til 0,8 l pr. ha i stadie 31–48, fra begyndende strækning til lige før skridning. Vækstreguleringen har den bedste effekt i afgrøder med god strækningsvækst, der er velforsynet med vand og ved dagtemperaturer over 15 grader samt nattemperaturer over 5 grader. En veletableret afgrøde i god vækst, med god vandforsyning og stor biomasse kræver den højeste dosering.



Første knæ er mærkbart mange steder, og vækstregulering er aktuelt fra stadie 32.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Oftest vil én behandling med vækstregulering være tilstrækkelig i engsvingel. Vækstregulering foretages med 0,8 l Cuadro / Moddus Start pr. ha fra stadie 33, når 2. knæ er mærkbart på mindst halvdelen af skuddene.

Er afgrøden meget kraftig og fortsætter det nedbørsrige vejr kan det blive nødvendigt med en ekstra tildeling. Der anvendes kun Cuadro eller Moddus Start og 2. behandling foretages ca. to uger efter første behandling, med op til 0,4 l Moddus Start / Cuadro pr. ha.

Kun ved anvendelse af Moddus M er opfodring af frøgræshalmen tilladt, og såfremt afgrøden ikke er vækstreguleret efter stadie 33.

Midlet Cuadro NT (250 g/l Trinexapac-ethyl) må anvendes med op til 1,2 l pr. ha. Moddus Start og Moddevo er godkendt med 1,2 l pr. ha (én behandling), eller 1,6 l pr. ha ved to behandlinger

Oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler og deres indhold af aktivstoffer findes [her](#)

Sygdomme og skadedyr

Er der meldug af betydning, behandles med et svampemiddel. Men det er kun tilrådeligt at blande svampe- og vækstreguleringsmidler, hvis afgrøden er velforsynet med vand.

Fra begyndende skridning og frem til blomstring kan der evt. behandles med 0,3 l Orius Gold pr. ha eller 0,3 l Folicur Xpert EC 240 pr. ha eller 0,3 l Amistar pr. ha i kombination med 0,15 l Comet Pro pr. ha.

Svampebehandlet frøgræshalm må ikke opfodres.

Bland kun svampemidler og Moddus hvis afgrøden er velforsynet med vand.

Er der begyndende angreb af lus, kan det være aktuelt at medtage 0,3 kg Lamdex pr. ha.

Frøgræshalm, der er behandlet med svampe- eller insektmidler må generelt ikke opfodres.