

## Ukrudtsbekæmpelse i ital. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2024

- Flere gode muligheder for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
- Vælg ukrudtsmiddel efter den aktuelle ukrudtsbestand
- Timing af behandlingen er vigtig

Det er nu tid til at få et overblik over ukrudtsproblemerne i frømarken, for at få valgt den bedste løsning til den aktuelle ukrudtsbestand. I nogle renbestandsmarker, hvor der ikke er bekæmpet ukrudt i efteråret, kan ukrudtet være vokset godt til. Derfor skal disse marker behandles tidligt.

**Fælles for de fleste midler, der kan anvendes i foråret er en svaghed overfor agerstedmoder og ærenpris. Derfor tilsættes 0,05 l DFF pr. ha. Vær opmærksom på at DFF kun må anvendes en gang i en vækstsæson, så hvis der har været anvendt DFF i efteråret, udelukker det anvendelse i foråret.**

### Primus/Saracen

Indeholder udelukkende aktiv-stoffet florasulam, og kan bruges tidligt.

**0,075 l Primus/Saracen + 0,05 l DFF pr. ha**

### Catch og Starane XL

Begge midler indeholder florasulam i blanding med et andet aktivstof, hvilket giver en bredere effekt. Samtidig er blandingen en fordel i forhold til resistens. Der er udvalgt tre løsninger til forskellige situationer.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

### Catch

En løsning med Catch giver en god bred ukrudtsbekæmpelse. Catch har en vis effekt på tidsler, men ikke på højde med Ariane FG S. Anvendes fra primo april.

**0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha**

### Ariane FG S

Kan anvendes i 1. års marker med op til 2,5 l pr. ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,0 l pr. ha. Er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkrav mindst 10-12°C.

Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en allround løsning mod frø- og rodukrudt. Er god ved en sen behandling og sprøjtingen udsættes til sidst i april/først i maj. Ariane FG S er det dyreste middel, men brug det, hvis tidsler er et problem.

**2,5 l Ariane FG S pr. ha eller  
1,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha**

### Starane XL

Er det Storkeæb og Hejreæb der er hovedproblemet er der en god mulighed i Starane XL. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til sidst i april.

**1,5 l Starane XL + 0,05 l DFF pr. ha**

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor-use. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes her:

[DFF](#) og [Catch](#)