

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2024

- **Udlæg i ærter og i vårbyg**
- **Opfølgning, udlæg i vintersæd**

Udlæg i ærter

Anvend Stomp CS + Fighter 480 med 10 – 14 dages mellemrum.

1. Behandling: 0,4 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet.
2. Behandling: 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet.

Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l pr. ha Fighter 480 i split og 1,0 l pr. ha såfremt behandlingen ikke deles.

Ved anvendelse af Stomp CS skal rødsvingel frøene være dækket af mindst 1 cm jord.

Udlæg i vårbyg

Mod enårig rapgræs

DFF kan anvendes med op til 0,1 l pr. ha umiddelbart efter såning på fugtig jord. Sørg for at rødsvingel frøene er dækket af mindst 1,5 cm jord for at undgå skade. Ved større nedbørsmængder umiddelbart efter behandlingen, kan rødsvingel skades af DFF.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. ha og **Hussar Plus OD** med 0,05 l pr. ha mod fremspiret enårig rapgræs samt vindaks og rajgræs. Begge midler har også bred effekt på tokimbladet ukrudt. Der tilsættes 0,5 l olie pr. ha.

Har man både engrapgræs og rødsvingel i sædskiftet, bør man overveje, hvor man har mest brug for effekten af Hussar, da gentagne sprøjtninger med Hussar kan medføre resistent enårig rapgræs.

Tokimbladet ukrudt

Er der anvendt DFF lige efter såning kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Zypar, Catch, Starane XL eller Express 50 SX, der alle har bred effekt overfor mange ukrudtsarter.

Løsningsforslag

7,5 g Express 50 SX + 0,3 l Starane XL pr. ha eller 0,5–0,75 l Mustang Forte pr. ha

Til bekæmpelse af tidsler er Mustang Forte bedst. Men husk der er restriktioner i forhold til den efterfølgende afgrøde ved anvendelse. Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på [etiketten](#).

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

MCPA kan også anvendes mod f.eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha senere i byggens stadie 30-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. MCPA virker bedst ved god temperatur, min 20° C. Det er vigtigt at trække behandlingen, til der er flest mulige blade på tidslerne.

Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt, kan anvendes i selve frømarken.

Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge resistens. Er der ikke anvendt DFF i forbindelse med såningen, kan der iblandes 0,05 l pr. ha DFF i en senere behandling, f.eks. mod agerstedmoder og ærenpris. DFF må kun anvendes én gang pr. sæson.

Anvend kun Hussar, hvor fremspiret græsukrudt skal bekæmpes, for at undgå udbredelsen af resistent enårig rapgræs overfor Hussar. Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge herbicid-resistens.

Primera Super/Foxtrot

Kan med 0,8 l pr. ha anvendes mod flyvehavre og agerrævehale frem til stadie 29.

Udlæg i vintersæd

Opfølgende behandling i foråret

Express 50 SX anvendes mod nyt ukrudt med 7,5 g pr. ha evt. i blanding med 0,05 l DFF pr. ha. Mod mange burresnerre eller store kamiller kan suppleres med 0,75 l Zypar eller 0,75 l Starane XL pr. ha. 0,75 l Mustang Forte pr. ha er velegnet til frøukrudt og tidsler.

Mod enårig rapgræs i vinterbyg kan Hussar OD med 0,025 l eller Hussar Plus OD med 0,035 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha anvendes. I hvede kan doseringen øges op til Hussar OD 0,05 l eller Hussar Plus OD 0,07 l pr. ha + olie. Hussar har effekt mod enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs og tokimbladet ukrudt.

Denne gruppe midler:

Express 50 SX, Trimmer, Nuance, Hussar, må man kun anvende ét af midlerne én gang pr. vækstår.

Mod agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs kan anvendes Topik 0,4 l pr. ha frem til stadie 29 eller 0,8 l Primera Super pr. ha frem til stadie 39.