

Vækstregulering og svampebekæmpelse af strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 6, 2024

- **Vækstregulering er ved at være aktuelt i de tidligste marker**
- **Svampebekæmpelse kan vente**

Vækstreguleringen nærmer sig i de tidligste strandsvingelmarker, hvis man vil følge en 2-delt strategi.

Strandsvingel giver en meget positiv udbytterespons for vækstregulering. Der anvendes normalt 0,8 l Moddus produkt pr. ha i maj – i perioden fra strækningsstadiet frem til begyndende skridning.

I kraftige marker med højt N-niveau og fodertyper af [strandsvingel](#), kan det komme på tale at vækstregulere to gange.

Strategi 2024

En behandling

Som udgangspunkt anbefaler vi én vækstregulering med 0,8 l Moddus produkt pr. ha i st. 49, lige før begyndende skridning normalt i midten af maj. Husk spredklæbemiddel. I plænetyperne vil det ofte være tilstrækkeligt.

Eller

2-delt

I meget kraftige velgødede marker med god vandforsyning, kan en 2-delt vækstreguleringsstrategi blive aktuel.

1. behandling

Her kan man begynde med 0,8 l Cuadro NT/Moddus Start pr. ha i stadiet 32-33 når 2. knæ kan erkendes på 10% af stænglerne.

2. behandling

Der følges op ca. 3 uger senere med 0,4 l Cuadro NT / Moddus Start pr. ha. Til 2. behandling kan der yderligere tilsættes Medax Top med op til 0,75 l pr. ha, hvis vækstforholdene fortsat er meget vegetative. I øvrigt skal vækstregulering altid foretages under hensyntagen til god vandforsyning og vækst.

Alternativt

1. behandling

Alternativt kan man indlede vækstreguleringen med 0,75 l Medax Top pr. ha, når 2. knæ kan erkendes på 10 pct. af stænglerne.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

2. behandling

Der følges op med op til 0,8 l Moddus produkt pr. ha ved begyndende skridning i stadiet 49.

- Cuadro NT er registreret med en dosering på 1,2 l pr. ha. Moddus Start/Moddevo er lige blevet godkendt med 1,2 l pr ha udbragt af én gang og 1,6 l pr ha ved en 2-delt anvendelse. Moddus M må maksimalt anvendes med 0,8 l pr. ha pr vækstsæson.

Find oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler og deres indhold af aktivstoffer [her](#).

Det er kun tilladt at opfodre vækstreguleret frøgræshalm, hvis der ikke er behandlet senere end stadiet 33 og kun med Moddus M / Sonis.

Ved vækstregulering er det vigtigt, at afgrøden er velgødet, der er god vandforsyning samt dagtemperaturer over 15 grader.

Svampebekæmpelse i strandsvingel

Meldugbekæmpelse i strandsvingel har i forsøgende ikke vist den store lønsomhed. Angreb af meldug i strandsvingel udvikler sig hurtigt, og kan blive så kraftige, at marken støver af meldug. Normalt forsvinder angrebet igen, også uden brug af svampemiddel. I forbindelse med en tidlig vækstregulering skal der derfor normalt ikke medtages et svampemiddel. Rust i strandsvingel ses kun sjældent, bladpletsvamp kan forekomme under fugtige forhold.

Fra begyndende skridning og frem til blomstring kan der evt. behandles med 0,3 l Folicur Xpert eller 0,3 l Amistar i kombination med 0,15 l Comet Pro pr. ha. Hvis der er angreb af bladplet kan der medtages 0,2 l Entargo pr. ha.

Svampebehandlet frøgræshalm må ikke opfodres. Bland kun svampemidler og Moddus hvis afgrøden er velforsynet med vand. I meget tørre år, er der set afgrødeskade, hvor svampemiddel og vækstreguleringsmiddel er blandet sammen.