

## Marksyn af frømarker

FrøavlsINFO, 2025

- **Frøavlskonsulenterne har påbegyndt synet af årets avl med henblik på certificering.**
- **Alle frøavlere opfordres til at gå deres marker igennem og afslå eller luge, hvor der er problemer.**
- **Vær opmærksom på reglerne for fradrag for visse fremmede græsser i afregningen.**

### Agerrævehale

Uønsket i alle frømarker og grænsen for indhold er lavere end andre arter, nemlig 0,3% mod normalt 1%.

Derfor er vores råd, at afslå de områder af frøafgrøden, hvor der findes agerrævehale. Hvis det er enkeltstående planter, skal de afluges på linje med flyvehavre. Agerrævehale planter i blomst har allerede efter ca. 10 dage dannet de første spiredygtige frø.

Afslåning skal formodentlig gentages inden høst, når agerrævehaleplanterne igen har dannet frøstængler. Afslut med en Round-up behandling så planterne slås ihjel.

### Ital. rajgræs i alm. rajgræs

Ital. rajgræs er en art der breder sig i sædskifterne. I alm. rajgræs er grænsen for certificering 1 pr. 10 m<sup>2</sup>. Har man områder med ital. rajgræs skal disse afslås, og er der enkelte planter i resten af marken, skal der luges eller pletsprøjtes med Round-up.

**Dette skal ske inden blomstring, da ital. rajgræs og alm. rajgræs krydser indbyrdes.**

### Anden sort i marken

Hvis der findes planter af samme art i marken, men af en anden sort, er det vigtigt at reagere før blomstringen.

Ved certificering af C1-produktion gælder der for de fleste arter en grænse på højst 1 plante pr. 10 m<sup>2</sup>. For engrapgræs gælder særlige regler. Grænsen for certificering af C1-produktion i monoklone engrapgræs sorter er 6 planter pr. 10 m<sup>2</sup> og 4 planter pr. 10 m<sup>2</sup> i flerklonede sorter (få sorter af denne type).

### Væselhale i rødsvingel og bakkesvingel

Afslå alle områder med væselhale. Ofte er der stor koncentration på forpløjninger og tynde områder af marken. Aflugning af enkeltplanter er

også en god ide. Væselhale er nem at se i sidste del af maj og begyndelsen af juni.

**Blød hejre og kvik** er også et problem i specielt rajgræsser og i engsvingel (blød hejre). Blød hejre står som oftest i kanterne af marken, så afslå disse. Kvikpletter bør også afslås.

**Alm rapgræs i engrapgræs** kan bekæmpes med weed-wiper, i de lave sorter, da der her er en højdeforskel. I lange sorter skal områder med alm. rapgræs afslås eller luges. Alm. rapgræs kan ikke renses fra engrapgræs.

**Flyvehavre** må som i andre afgrøder ikke findes i marken. Arealet kan ikke godkendes før det er frit for flyvehavre.

### Afslåning af kanter

Generelt vil det være en rigtig god ide, at afslå alle kanter på frømarkerne, da der ofte er forskellige fremmede græsser her. Også i udlægsmarkerne kan afslåning af kanter være en god ide, da man herved undgår at få spredt ukrudtsfrø fra kanterne og ind i næste års frømark.

I alle tilfælde, hvor der er en højdeforskel på mindst 15 cm fra ukrudt ned til afgrøde, kan en weed-wiper anvendes.

### Lugning er en overset disciplin

Lugning af frømarkerne er nødvendig i de fleste tilfælde, for at opnå topkvalitet. Det vil sige at man afsætter en dag eller to, hvor alle ansatte udstyres med en hånd-weedwiper eller en rygsprøjte, og går frømarkerne igennem.

### Afstandskrav og sædskiftekrav

For at certificering kan ske, skal afstand til andre frømarker og afstand i sædskiftet til tidligere frøavl være opfyldt. Disse krav skulle på nuværende tidspunkt være i orden, men hvis der alligevel er afstandsproblemer, skal afstanden etableres inden blomstring, ellers kan marken ikke godkendes.

**Vær specielt opmærksom på afstand til brak. Hvis der er fare for krydsbestøvning fra GLM-10 brak, skal afstanden etableres i frømarken, da det ikke er tilladt at afslå GLM-10 brak.**

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF