Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med hvidkløverudlæg

FrøavlsINFO nr. 2, 2026

- **Start med 0,05 l DFF pr. ha før fremspiring**
- **Stomp CS kræver jordfugt og en sådybde på minimum 1 cm**
- **Harmony 50 SX, højst 6 gram**
- **Vær opmærksom på bladrandbiller**

Udlæg af hvidkløver i vårbyg
Er der anvendt **0,05 l DFF pr. ha umiddelbart efter såning**, er der mulighed for at afvendte gode effektforhold til en opfølgende ukrudts-behandling. Oftest vil det være tilstrækkeligt at anvende Basagran SG som en opfølgende behandling ovenpå anvendelsen af DFF.

Er der ikke anvendt DFF anbefaler vi at behandle kløverudlægsmarken med **0,9 l Stomp CS + 0,67 kg Basagran SG + 0,5 l olie pr. ha**, som foretages når ukrudtet maks. har ét løvblad – uafhængigt af udlægsplanternes størrelse.

Det er ikke tilladt at foretage splitsprøjtning med Basagran SG i byg med udlæg. Effekten er meget afhængig af de klimatiske forhold, der er omkring sprøjtning, hvilket er:
Grødevejr, høj luft-fugtighed, høj lysintensitet og temperaturer på 15 – 20°C, og gerne en morgensprøjtning.

Udlægges der både hvidkløver og engrapgræs, og foråret bliver koldt og vådt, kan Stomp hæmme engrapgræsset. Under sådanne forhold reduceres doseringen af Stomp eller undlades helt.

Stomp og Basagran SG kan evt. udbringes hver for sig, hvis temperaturen bliver ved at være lav. Første behandling med **Stomp**, hvor virkningen er afhængig af **god jordfugtighed**, og anden behandling med **Basagran SG**, når der er **høj temperatur og grødevejr**.

Eventuel opfølgende behandling
Hvis der er udfordringer med sent fremspiret pileurt, hyrdetaske og raps, kan der følges op med en behandling med Harmony 50 SX, når vårbyggen er godt busket og kløveren er veletableret, evt. i forbindelse med en svampebehandling. Undgå sprøjtning med Harmony 50 SX under tørre forhold, da der er risiko for skade på kløveren.
Der anvendes **3-5 gram Harmony 50 SX pr. ha + spredeklæbemiddel**.

Anvend ikke Harmony Plus 50 SX.

Bladrandbiller
Er der gnav af bladrandbiller og forekomst af trips i kornet, skal der sammen med ukrudts-bekæmpelsen tilsættes en halv normaldosering af Lamdex.

Tromling
Marken tromles hvis det er tørt, det øger kapillærvirkningen. Tromlingen foretages bedst inden ukrudtsbekæmpelse, så nyfremspiring af ukrudt undgås. Men pas på ikke at tromle lige før nedbør. Hvidkløverplanterne gror langsomt til, hvis der dannes skorpe på jordoverfladen og en iltfattig jord giver dårlige forhold for kløverens knoldbakterier.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

»Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde.
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse«