

Etablering af alm. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 3, 2026

- **Korrekt etablering af udlæg danner grundlaget for topudbytte**
- **Plænesorter kan med fordel sås på dobbelt rækkeafstand**

Alm. rajgræs er en af de arter, der er relativ nem at etablere. Den er hurtigvoksende og konkurrencestærk. Alligevel er det vigtigt at fokusere på etableringen i denne art, da en god etablering er med til at mindske ukrudts-problemer i selve frømarken.

Diploide og tetraploide plænesorter

Etablering sker bedst i foråret ved såning på dobbelt rækkeafstand, hvor rajgræsset placeres mellem kornrækkerne. Forsøg har vist, at udbyttetabet i dæksæden, ved såning på dobbelt rækkeafstand, kun påvirkes minimalt.

Det er vigtigt at justere sådybden, så frøet bliver placeret i **2 cm dybde**, og kornet i normal sådybde.

Ved såning på dobbelt rækkeafstand kan udsædsmængden af korn fint reduceres med 10-20%.

Tetraploide og diploide fodersorter

Såning på dobbelt rækkeafstand, hvor frøet placeres i **2-3 cm dybde**, giver den største sikkerhed for en vellykket etablering af udlægget.

Kornet kan i nogle tilfælde sås med normal rækkeafstand, hvis der er risiko for, at udlægget bliver for kraftig i forhold til vårbyggen – især ved tetraploide fodersorter.

Du kan finde flere [sortsinformationer](#) på vores hjemmeside eller kontakte din frøavlskonsulent.

Er alm. rajgræs veletableret – uden spring i rækkerne – er der senere mulighed for at rækkebehandle mod græsukrudt i afgrøden. Det kan være mekanisk eller kemisk, hvor der behandles i mellem rækkerne af alm. rajgræs. En senere rækkebehandling skal planlægges allerede nu, hvor afgrøden skal etableres.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Udsædsmængde

Den anbefalede udsædsmængde varierer fra 7-10 kg pr. ha afhængig af frøstørrelse. Tilstræb at etablere 100-125 planter pr. m². Markspiringsprocenten vil være omkring 50 % under normale forhold. I praksis betyder det at:

- **Diploide sorter sås med 7-9 kg pr. ha**
- **Tetraploide sorter sås med 8-10 kg pr. ha**

Det er vigtigt at bruge tidligere års erfaringer, da markspiringsprocenten kan variere meget.

Udlæg i vårbyg

90 pct. af arealet med alm. rajgræs udlægges i vårbyg. Det er vigtigt at tage hensyn til udlægget ved dyrkning af dæksæden og følgende anbefales:

- Udsædsmængden i vårbyg reduceres med 10-20%
- Vælg en [bygsort](#) med lav tendens til lejesæd og nedknækning af strå og aks
- Moderat kvælstofgødsning
- Undgå overlap med dæksæd og gødsningen
- Vækstregulering anbefales i vårbyg. Evt. to behandlinger med nedsat dosis af Cerone og Moddus M

Ukrudt

Korn og frø, der er sået på dobbelt rækkeafstand, giver en god konkurrence mod ukrudt herunder også enårig rapgræs.

En behandling med **0,1-0,15 l DFF pr. ha** på fugtig jord lige efter såning, giver god bekæmpelse af enårig rapgræs. Bedst effekt opnås ved behandling inden fremspiring. Korrekt såning i 2 cm dybde, er en forudsætning, når der anvendes DFF.