

Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 4, 2026

- **Mange gode muligheder for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt**
- **Vælg middel efter ukrudtsbestanden**
- **Timing af behandlingen er vigtig**

Det er nu tid til at få et overblik over ukrudtsproblemerne i frømarken, for at få valgt den bedste løsning til den aktuelle ukrudtsbestand. Renbestandsmarker, der ikke er behandlet i efteråret, kræver en tidlig behandling.

Fælles for de fleste midler, der kan anvendes i foråret er en svaghed overfor agerstedmoder og ærenpris. Derfor tilsættes **0,05 l DFF pr. ha**. DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson, så er der anvendt DFF i efteråret udelukker det anvendelse i foråret.

Catch, Starane XL, Mustang Forte og **Zypar** indeholder florasulam i blanding med et andet aktivstof, hvilket giver en bredere effekt. Samtidig er blandinger en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt fem løsninger til forskellige situationer.

Zypar

I de sidste par år har Zypar været anvendt en del, og med godt resultat. Midlet har lidt bedre effekt end Catch på **storkenæb, hejrenæb og rød tvetand**. Kan anvendes ved lave temperaturer. Zypar må ikke bruges i renbestandsudlæg. To års forsøg viser at sen anvendelse kan være ødelæggende for frøudviklingen, **sidste frist** for anvendelse vil derfor være ca. d. **10. april**.

0,75 Zypar + 0,05 l DFF pr. ha

Mustang Forte

Mustang Forte bekæmper de fleste tokimbladede ukrudtsarter, og har samtidig også en sideeffekt på visse **rodukrudtsarter**. Mustang Forte må anvendes indtil stadie 32, vi anbefaler dog at behandlingen udføres tidligst muligt, hvorved den bedste effekt opnås. Mustang Forte har restriktioner i forhold til halmanvendelse og efterfølgende afgrøde.

0,75 l Mustang Forte + 0,05 l DFF pr. ha

Indgår der andre afgrøder end græs, korn, raps og majs, eller skal halmen sælges til andet end industri eller afbrænding, bør man sætte sig grundigt ind i restriktionerne der gælder for Mustang Forte.

Catch

En løsning med Catch giver en **god og billig** ukrudtsbekæmpelse, men bekæmpelsen af burrenerre, kornblomst, rodukrudt og raps er ikke på niveau med Mustang Forte. Oplagt løsning hvor Mustang Forte ikke er muligt. Catch må anvendes indtil stadie 32. vi anbefaler dog at behandlingen udføres tidligst muligt, hvorved den bedste effekt opnås.

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha

Ariane FG S

Kan anvendes i 1. års marker med op til 2,5 l pr. ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,0 l pr. ha. **Er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken.**

Temperaturkravet er mindst 12-15°C.

Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en allround løsning mod frø- og rodukrudt. Er god ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj. Ariane FG S er det dyreste middel, men bør anvendes, hvis tidsler er et problem.

**2,5 l Ariane FG S pr. ha eller
1,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha**

Starane XL

Er det **burrenerre eller skræpper** der er hovedproblemet er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til sidst i april.

1,5 l Starane XL + 0,05 l DFF pr. ha

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes her:

[DFF](#), [Mustang Forte](#), [Zypar](#) og [Catch](#)

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

»Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde.
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse«