

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med alm. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 5, 2025

- En ren frømark forudsætter en effektiv ukrudtsbekæmpelse i dæksæden
- Bekæmpelse af enårig rapgræs og tidsler starter i dæksæden
- Mustang Forte er stærk mod tidsler

Udlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af alm. rajgræs. Vælg en kombination af midler, der passer til det ukrudt, der findes i marken.

Bekæmpelse af enårig rapgræs

En behandling med **0,1-0,12 l DFF pr. ha** på fugtig jord efter såning og før fremspiring virker godt på enårig rapgræs. Korrekt såning i 2 cm dybde, er en forudsætning, når der anvendes DFF, da der ellers kan ske skade på udlægget. DFF må anvendes med op til 0,15 l pr. ha.

Tokimbladet ukrudt

Der er flere gode løsninger til ukrudtsbekæmpelse i dæksæd. Det er vigtigt at kombinere mellem flere virkemekanismer for at forebygge resistens.

Er der ikke anvendt DFF lige efter såning, kan der iblandes **0,05 l DFF pr. ha**. DFF må kun anvendes én gang pr. sæson.

Er der anvendt DFF lige efter såning kan opfølgning ske med fx Mustang Forte, Zypar, Pixxaro EC, Express 50 SX, Starane XL, Primus XL eller Catch.



Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Løsningsforslag

- **0,5 – 0,75 l Mustang Forte pr. ha**

Eller

- **7,5 g Express 50 SX + 0,3 l Starane XL pr. ha**

Husk der er restriktioner på Mustang Forte i forhold til efterfølgende afgrøde.

Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på etiketten som kan hentes [her](#).

Rodukrudt

MCPA kan anvendes mod rodukudt som tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggens stadie 30-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. Sprøjt ved gode temperaturer på minimum 20°C. Det er vigtigt at vente med behandlingen, til der er flest mulige blade på ukrudtet.

Mustang Forte er stærk mod agertidsler, men skal anvendes senest ved byggens stadie 32. Mustang Forte må anvendes med op til 0,75 l pr. ha i vårbyg. I forbindelse med anvendelse af Mustang Forte er der flere restriktioner, som fremgår af [etiketten](#).

Bekæmp tidsler effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt kan anvendes i selve frømarken.

Primera Super / Foxtrot

Kan anvendes i dæksæd mod flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med **0,8 l pr. ha + 0,1 l spredklæbemiddel pr. 100 l vand**.