

Hussar i bakkesvingel mod enårig rapgræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2026

- **Tidlig sprøjtning er vigtigt.**
- **Hussar bekæmper enårig rapgræs.**

Enårig rapgræs gror stort set hele året. Særligt i 1. års marker kan stor forekomst af enårig rapgræs, f.eks. i forpløjninger og lignende steder, genere bakkesvingel.

Vi har erfaring for, at de tidlige behandlinger med Hussar i bakkesvingel er de mest effektive og tillige de mest skånsomme overfor afgrøden. Bakkesvinglens vækst kan godt sættes i stå i en periode efter udsprøjtning af Hussar.

Valg af middel

Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse med op til 0,1 l pr. ha med mulighed for to behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 0,02 l Hussar OD pr. ha i efteråret, er det tilladt at anvende op til 0,08 l Hussar OD pr. ha om foråret. Er der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der behandles to gange om foråret med i alt 0,1 l pr. ha.

Hussar Plus OD er en kombination af aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD, og må anvendes i marts-april, hvis der ikke har været anvendt Hussar OD i efteråret.

Der må bruges i alt 0,14 l Hussar Plus OD pr. ha pr. vækstsæson. Er der anvendt 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha i efteråret, må der i foråret anvendes op til 0,09 l pr. ha i én behandling.

Ved ren forårsanvendelse anvendes 0,05-0,14 l Hussar Plus OD pr. ha én gang eller evt. som splitsprøjtning med f.eks. 0,08 l og 0,04 l Hussar Plus OD pr. ha.

DFF kan kombineres med Hussar, med en dosering på op til 0,1 l DFF pr. ha. DFF's jordeffekt kan forebygge mod nyfremspiring af enårig rapgræs i områder uden plantedække, f.eks. i 1. års marker. Agerstedmoder og i nogen grad ærenpris kan bekæmpes med 0,05 l DFF pr. ha. DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Anvendelse og effekt

Hussar virker optimalt fra 6°C og anvendes, når ukrudtsplanterne er i vækst om foråret.

Hussar Plus OD er afprøvet i Landsforsøgene og har en lidt bedre og mere holdbar effekt på enårig rapgræs end Hussar OD.

Hussar har også effekt på tokimbladet ukrudt som f.eks. kamille og fuglegræs; men bør kun anvendes, hvor det er nødvendigt af hensyn til bekæmpelse af enårig rapgræs, for at undgå resistensopbygning overfor aktivstoffet.

Anbefaling forår 2026

Middel	1. behandling	2. behandling
Hussar OD	0,05-0,07 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha	0,03-0,05 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha
Eller		
Hussar Plus OD	0,06-0,08 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha	0,03-0,05 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha
Ved behandling med Hussar i efterår		
Hussar OD	0,04-0,06 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha	
Eller		
Hussar Plus OD	0,05-0,08 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha	

Én behandling i foråret vil oftest være tilstrækkelig.

Må ikke anvendes i samme vækstår:

Hussar OD, Hussar Plus OD og tribenuron-methyl-produkter (fx Express) – pga. risiko for resistensdannelse