

Efterårsbehandling i hundegræs

FrøavlsINFO nr. 8, 2026

- **Afpudsning**
- **Gødskning**
- **Ukrudt**

Efterårsbehandling forud for 1. høstår

Når dæksæden er høstet og halmen enten er fjernet eller snittet, er **afpudsning af stubben en af de første ting, der skal ske**. Det er en fordel, at der er sættes så lav en stub som muligt med mejetærskeren. Hvis der er sat høj stub, er det endnu vigtigere hurtigst muligt at få afpudset.

Det er vigtigt at de **nye planter busker sig mest muligt**, og dette opnås **ved at afpudse stubben** så lavt som muligt, typisk **i en højde på 5-6 centimeter**. Afpudsningen reducerer stubbens skyggevirkning, så der kan komme mest muligt lys ned til de små planter.

Afpudsning efter 1. års høst

I hundegræs er det vigtigt med en **tæt afpudsning i 8-10 cm højde**. Hvis hundegræs-halmen er snittet, vil et par afpudsninger være med til at sørge for en findeling og fordeling af halm og stubrester, så det kan forsvinde ned mellem planterne og blive omsat. Afpudsningen kan ske enten med slagleklipper eller rotorklipper. Skiveslåmaskinen er ligeledes god til at slå i bund, men skiveslåmaskinen lægger det afklippede materiale oven på planterne, og det bevirker, at materialet har svært ved at blive omsat. Er det tilfældet må materialet enten fjernes eller knuses med slagleklipper eller rotorklipper.

Der følges op med **afpudsning i 10-12 cm højde**, et par gange **i løbet af efteråret** i forhold til mængden af nedbør, og hvor vegetativ afgrøden er. Hundegræs er en typisk tuegræs, og i forbindelse med sidste afpudsning er det vigtigt ikke at beskadige centeret af planterne. Der skal være ca. 5 cm bladlængde på de midterste blade efter afpudsningen. Der må ikke være mere materiale, end det kan forsvinde ned mellem planterne og omsættes. Inden vinteren og det tidlige forår skal alt materiale være omsat. For meget materiale i efteråret, må om nødvendigt rives sammen og fjernes.

Afgræsning med **får** kan være et udmærket alternativ til mekanisk afpudsning. Her er det stadig vigtigt, at gammel stub er fjernet helt. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig mange får, **ca. 30 stk. pr. ha**, og anvend gerne sribegræsning, så fårene får gjort arbejdet færdigt, inden de flyttes videre. Sen afgræsning i november må ikke efterlade græsset kortere end 6-8 cm højde.

Hundegræs kan uden problemer gå vinteren i møde med en bladlængde i det sene efterår op til 20 cm, men afgrøden **må ikke have en kraftig og hængende bladmasse**, da det kan give grobund for **sneskimmel**.

Gødskning

Efter afpudsning i **første halvdel af oktober tilføres 50-60 kg N pr. ha**.

Tildelingen kan ske i form af gylle, hvis fordelingen kan ske ensartet.

I frodige år kan et slæt i slutningen af september, være et godt alternativ til afpudsninger. Marker hvor der tages slæt bør gødskes med 60-70 kg N pr. ha lige efter høst. Efter slættet, der ikke må tages dybere end 8 cm, gødes marken igen med den normale mængde kvælstof på 50-60 kg N pr. ha.

Bekæmpelse af bredbladet ukrudt

Ukrudt kan bekæmpes i september med fx **7,5 g Express 50 SX pr. ha + spredeklæbemiddel** mod kamiller, fuglegræs og korsblomstrede arter. I marker med agerstedmoder, tvetand og ærenpris tilsættes **0,05 l DFF pr. ha**.

Primera Super og Foxtrot er godkendt til brug i hundegræs i efteråret med **0,4 l pr. ha** mod vindaks og agerrævehale. **Stomp CS** er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs med **1,0 l pr. ha** og har nogen effekt mod rapgræs og væselhale. Behandl på fugtig jord før ukrudtets fremspiring.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF