

## Hussar i rødsvingel mod enårig rapgræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2026

- **Tidlig sprøjtning er vigtigt.**
- **Hussar bekæmper enårig rapgræs.**

Enårig rapgræs gror stort set hele året. Særligt i 1. års marker og specielt i rødsvingel sorter uden udløbere, kan stor forekomst af enårig rapgræs, f.eks. i forpløjninger og lignende steder, genere rødsvinglen.

Vi har erfaring for, at de tidlige behandlinger med Hussar i rødsvingel er de mest effektive og tillige de mest skånsomme overfor afgrøden. Rødsvinglens vækst kan godt sættes i stå i en periode efter udsprøjtning af Hussar.

### Valg af middel

Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse med op til 0,1 l pr. ha med mulighed for to behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er anvendt 0,02 l Hussar OD pr. ha i efteråret, er det tilladt at anvende op til 0,08 l Hussar OD pr. ha om foråret. Er der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der behandles to gange om foråret med i alt 0,1 l pr. ha.

Hussar Plus OD er en kombination af aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD, og må anvendes i marts-april, hvis der ikke har været anvendt Hussar OD i efteråret.

Der må bruges i alt 0,14 l Hussar Plus OD pr. ha pr. vækstsæson. Er der anvendt 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha i efteråret, må der i foråret anvendes op til 0,09 l pr. ha i én behandling.

Ved ren forårsanvendelse anvendes 0,05-0,14 l Hussar Plus OD pr. ha én gang eller evt. som splitsprøjtning med f.eks. 0,08 l og 0,04 l Hussar Plus OD pr. ha.

DFF kan kombineres med Hussar, med en dosering på op til 0,15 l DFF pr. ha. DFF's jordeffekt kan forebygge mod nyfremspiring af enårig rapgræs i områder uden plantedække, f.eks. i 1. års marker. Agerstedmoder og i nogen grad ærenpris kan bekæmpes med 0,05 l DFF pr. ha. DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

### Anvendelse og effekt

Hussar virker optimalt fra 6°C og anvendes, når ukrudtsplanterne er i vækst om foråret.

Hussar Plus OD er afprøvet i Landsforsøgene og har en lidt bedre og mere holdbar effekt på enårig rapgræs end Hussar OD.

Hussar har også effekt på tokimbladet ukrudt som f.eks. kamille og fuglegræs; men bør kun anvendes, hvor det er nødvendigt af hensyn til bekæmpelse af enårig rapgræs, for at undgå resistensopbygning overfor aktivstoffet.

### Anbefaling forår 2026

Middel	1. behandling	2. behandling
Hussar OD	0,05-0,07 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha	0,03-0,05 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha
<b>Eller</b>		
Hussar Plus OD	0,06-0,08 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha	0,03-0,05 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha
<b>Ved behandling med Hussar i efterår</b>		
Hussar OD	0,04-0,06 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha	
<b>Eller</b>		
Hussar Plus OD	0,05-0,08 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha	

**Én behandling i foråret vil oftest være tilstrækkelig.**

### Må ikke anvendes i samme vækstår:

Hussar OD, Hussar Plus OD og tribenuron-methyl-produkter (fx Express) – pga. risiko for resistensdannelse