

## Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2026

- Tokimbladet ukrudt i frømarken skal bekæmpes snarest mulig
- Spildkorn og agerrævehale
- Bladpletsvampe

### Bekæmp tokimbladet ukrudt nu

Rødsvingel er en dårlig konkurrent så længe afgrøden ikke er groet sammen, og ukrudtsplanter der har overlevet efterårets behandlinger er allerede store, så krav til effekt overfor tokimbladet ukrudt er høj. Derfor er det vigtigt at få udført behandlingen nu. Vent ikke på evt. tidsforekomst. Disse må der tages stilling til senere i vækstsæsonen.

### DFF

DFF produkterne må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. Er produktet ikke anvendt i efteråret, er DFF en vigtig blandingspartner til de efterfølgende løsninger, mod nyfremspiring af enårig rapgræs. Det er også det eneste produkt med god effekt på agerstedmoder og ærenpris.

Er det kun tokimbladet ukrudt der skal bekæmpes i kombination med et andet middel, anvendes den lave dosering.

**0,05 - 0,1 l DFF pr. ha**

### Zypar

Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zypar er aktuell fra nu. Zypar har speciel god effekt på **hundepersille, storkenæb, lægejordrøg og lancetbladet vejbred**, men bekæmper også kamille og de fleste andre tokimbladete ukrudtsarter så længe de ikke er blevet for store.

To års forsøg viser at sen anvendelse kan være ødelæggende for frøudviklingen, **sidste frist** for anvendelse vil derfor være senest d. **10. april**.

**0,75 – 1,0 l Zypar pr. ha**

### Catch

Catch giver en **god og billig** ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burrenerre og kornblomst. Kamille og storkenæb bekæmpes kun inden planterne bliver store, så løsningen er aktuell primo april.

En god blandingspartner kunne være 0,05 l Primus pr. ha. ved forekomst af stort ukrudt.

**0,6 l Catch pr. ha**

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

### Starane XL

Er hovedproblemet **burrenerre og skræpper** er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er mindst 10-15°C, hvilket gør, at behandlingen trækkes til temperaturen er tilstede typisk i april. Løsningen er relativ dyr.

**1,5 l Starane XL pr. ha**

### Ariane FG S

Er primært interessant **mod tidsler**. Ariane kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års marker og i ældre marker med op til 3 l pr. ha. En dosering på 1,5 l pr. ha vil ofte være tilstrækkeligt overfor tidsler, hvis det er en opfølgende behandling. Sidste frist for anvendelse st. 31.

Temperaturkravet er på mindst 15°C.

**Mod tidsler 1,5 – 1,75 l Ariane FG S pr. ha**

### Agil

Konkurrerende spildkorn og agerrævehale, bekæmpes bedst i starten af april. Begge dele vil ofte nå at blive for kraftige, hvis de først bekæmpes sammen med grove græsser i maj. Spildkorn kan bekæmpes/hæmmes med 0,4 l Agil pr. ha, men er der agerrævehale af betydning anvendes 0,8 l Agil pr. ha. Bemærk at der kun må behandles i alt 2 gange med max. 0,8 l Agil pr. ha pr. vækstsæson. Behandlingen mod agerrævehale følges senere op i første halvdel af maj med Focus Ultra, mere herom senere.

**0,4 – 0,8 l Agil pr. ha**

**+ 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand**

Følgende midler er godkendt til mindre anvendelse i rødsvingel, og vejledningen for de enkelte midler kan findes her [DFF](#), [Zypar](#), [Catch](#).

### Bladsvampe

I nogle rødsvingel marker ser vi ind imellem en del meldug. Disse angreb er forbigående og forsvinder normalt af sig selv i løbet af et par uger. Bladpletsvampe kan undertiden forekomme med kraftigere angreb. Forsøg har dog givet meget varierende merudbytte for svampebekæmpelse i foråret. Ved kraftige angreb kan der fx anvendes 0,3 l Folicur Expert EC 240 + 0,15 l Comet Pro pr. ha eller 0,5 l Balaya pr. ha.