

## Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2026

- **Udlæg i ærter og i vårbyg**
- **Bekæmpelse af enårig rapgræs og tidsler starter i dæksæden**
- **Mustang Forte stærk mod tidsler**

### Udlæg i ærter

Stomp CS med gammel etikette er tilladt at anvende som splitbehandling, hvorved den bedste effekt opnås. Anvend Stomp CS + Basagran SG med 10 – 14 dages mellemrum.

1. Behandling: **0,2 kg Basagran SG + 0,5 l Stomp CS + 0,5 l Olie pr. ha** udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet.
2. Behandling: **0,3 kg Basagran SG + 0,5 l Stomp CS + 0,5 l Olie pr. ha** udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet.

Ved anvendelse af Stomp CS skal rødsvingel frøene være dækket af mindst 1 cm jord.

Stomp CS med ny etikette er kun tilladt at anvende én gang pr. vækstår, med max 1 l pr. ha. Ærter må tildeles maksimalt 0,5 kg Basagran SG pr. ha i split og 0,6 kg pr. ha såfremt behandlingen ikke deles.

### Udlæg i vårbyg

#### Mod enårig rapgræs

DFF kan anvendes med op til **0,1 l pr. ha umiddelbart efter såning på fugtig jord**. Sørg for at rødsvingel frøene er dækket af mindst 1,5 cm jord for at undgå skade. Ved større nedbørsmængder umiddelbart efter behandlingen, kan rødsvingel skades af DFF.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. ha og Hussar Plus OD med 0,05 l pr. ha mod fremspiret enårig rapgræs samt vindaks og rajgræs. Begge midler har også bred effekt på tokimbladet ukrudt. Der tilsættes 0,5 l olie pr. ha.

Der er konstateret **resistens af enårig rapgræs** over for Hussar, så anvend kun midlerne, hvor fremspiret græsukrudt skal bekæmpes. Har man både engrapgræs og rødsvingel i sædskiftet, bør man overveje, hvor man har mest brug for effekten af Hussar, da gentagne sprøjtninger med Hussar kan medføre resistent enårig rapgræs.

#### Tokimbladet ukrudt

Er der anvendt DFF lige efter såning kan opfølgning ske med fx Mustang Forte, Pixxaro, Zypar, Catch, Starane XL eller Express 50 SX, der alle har bred effekt overfor mange ukrudtsarter.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

### Løsningsforslag

- **0,5–0,75 l Mustang Forte pr. ha**  
Eller
- **0,25 l Pixxaro + 5 g Express 50 SX pr. ha**  
Eller
- **0,25 l Pixxaro + 0,05 l Hussar Plus OD + 0,5 olie pr. ha**

Til bekæmpelse af tidsler er Mustang Forte bedst. Men husk der er restriktioner i forhold til den efterfølgende afgrøde ved anvendelse. Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på [etiketten](#).

MCPA kan også anvendes mod fx tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha senere i byggens stadie 30-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. MCPA virker bedst ved god temperatur, min 20° C. Det er vigtigt at trække behandlingen, til der er flest mulige blade på tidslerne.

**Bekæmp tidsler effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt, kan anvendes i selve frømarken.**

Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge resistens.

Er der **ikke** anvendt DFF i forbindelse med såningen, kan der iblandes **0,05 l pr. ha DFF** i en senere behandling, fx mod agerstedmoder og ærenpris. DFF må kun anvendes én gang pr. sæson.

#### Primera Super / Foxtrot

Kan med **0,8 l pr. ha** anvendes mod flyvehavre og agerrævehale frem til stadie 29.

